



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ,  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πληροφορίες: Α. Καμπλέτσας  
Τηλ.: 26510 40707(εσωτ.:80064)

Να  
κρατηθεί σε  
αρχείο

Εγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες (**εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα**) για την  
καλλιέργεια της **ελιάς**

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΥΡΗΝΟΥΡΥΤΗΣ	ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ- ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ	ΡΥΓΧΙΤΗΣ	ΜΥΤΗΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ	ΠΟΛΛΙΝΙΑ	ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ	ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ	ΑΚΑΡΕΑ	ΔΑΚΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ	+											+	7
ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ		+	+				+	+	+				3
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΣΙΛΙΚΕΙΤ												+	0
ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΤΗΣ ΘΟΥΡΙΓΓΙΑΣ (Βιολογικό)	+												0
ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ	+		+	+			+					+	Δολωματικοί + καλύψεως 7
ΖΕΤΑ-ΣΥΠΕΡΜΕΘΡΙΝ	+											+	μία εφαρμογή έως το τέλος της άνθησης
ΛΑΜΔΑ ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ	+		+		+				+	+		+	-Δολωμ.ψεκασμοί για δάκο 7 ημέρ. -Ψεκ. Καλύψεως: 7 ή 14 ή 120 ημέρ. (ανάλογα με το σκεύασμα)
ΜΠΟΒΕΡΙΑ ΜΠΑΣΙΑΝΑ (Βιολογικό)												+	0
ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ		+	+			+	+	+				+	21
ΠΥΡΙΠΡΟΞΙΦΕΝ			+										Πριν άνθηση
ΣΟΥΛΦΟΥΡ											+		90 (πράσινη ελιά Χαλκιδικής)
ΣΠΙΝΕΤΟΡΑΜ	+												21 καρπόβια
ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ												+	Δολωμ.ψεκ.14
ΣΠΙΡΟΤΕΤΡΑΜΑΤ		+	+			+							14

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΥΡΗΝΟΤΡΥΤΗΣ	ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ- ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ	ΡΥΓΧΙΤΗΣ	ΜΥΤΗΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ	ΠΟΛΛΙΝΙΑ	ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ	ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ	ΑΚΑΡΕΑ	ΔΑΚΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ												+	Δολωμ.ψεκ. εδάφους
ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ + ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ												+	-
ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ + ΟΥΡΙΑ												+	Δολωμ.ψεκ. εδάφους
ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ			+										60
ΦΟΣΜΕΤ	+		+	+						+		+	21

**Σημείωση :** Οι δραστικές ουσίες **Δελταμεθρίν, Λάμδα σουαλοθρίν** και **Υδρολυμένες πρωτεΐνες** κυκλοφορούν και σε σκευάσματα που επιτυγχάνουν μαζική προσέλκυση και θανάτωση του **δάκου** με τη μέθοδο ανάρτησης παγίδων στα ελαιόδεντρα. Αυτή η μέθοδος μαζικής παγίδευσης του δάκου είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν πραγματοποιούνται ψεκασμοί και δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση από υπολείμματα φυτοφαρμάκων στις ελιές.

**Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε).**

**Διαβάζετε την ετικέτα συσκευασίας.**

**Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.**

**Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.**

**Ιωάννινα, 1 Μαρτίου 2022**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ,  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πληροφορίες: Α. Καμπλέτσας  
Τηλ.: 26510 40707

Να  
κρατηθεί σε  
αρχείο

Εγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες (**μυκητοκτόνα**) για την καλλιέργεια της  
ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ	ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ	ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΑΜΥΛΟΛΙΚΟΥΕΦΑΣΙΕΝΣ			+	Έως την πλήρη ωρίμανση
ΓΕΡΑΝΙΟΛ-ΕΥΓΕΝΟΛ-ΘΥΜΟΛ			+	7 (Πριν την ανθοφορία και στην έναρξη της ωρίμανσης)
ΚΡΕΣΟΞΥΜ-ΜΕΘΥΛ	+			-Πριν άνθηση (βρώσιμες ελιές) -30 (ελαιοποιήσιμες ελιές)
ΚΡΕΣΟΞΥΜ-ΜΕΘΥΛ + ΝΤΙΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ	+		+	Πριν άνθηση
ΝΤΙΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ	+		+	30
ΝΤΙΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ + ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ	+		+	1 μόνον εφαρμογή πριν άνθηση
ΝΤΟΝΤΙΝ	+		+	7
ΠΟΤΑΣΙΟΥΜ ΦΟΣΦΟΝΕΙΤ	+			15
ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ	+		+	105
ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ	+			1 μόνον εφαρμογή πριν άνθηση
ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ + ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ	+			1 μόνον εφαρμογή πριν άνθηση
ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ	+		+	14 (max: 2 εφαρμογές / 1 μόνον εφαρμογή κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου)
ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ	+	+	+	14 / 15 / 21
ΧΑΛΚΟΣ ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ	+	+	+	21
ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ	+	+	+	21

ΧΑΛΚΟΣ ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΙΪΚΟΣ	+	+	+	21
ΧΑΛΚΟΣ ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ	+			21
ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ + ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ	+		+	Πριν την ανθοφορία ή μετά τη συγκομιδή

**Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε)**

**Διαβάζετε την ετικέτα συσκευασίας.**

**Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.**

**Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.**

**Ιωάννινα, 1 Μαρτίου 2022**