

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Πληρ.: Δρ. Γεωργιος Χρ. Λυκοκανέλλος
Τηλ.: 2610-271.959 (80261)
E-mail: glykokanellos@minagric.gr

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (**μυκητοκτόνα**) με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

Εγγυημένη Σύνθεση	ΚΟΡΥΦΟΞΗΡΑ	ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ	ΚΑΠΝΙΑ	ΣΗΨΕΙΣ			ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ	Χημική Ομάδα	Δράση Π= Προληπτική, Θ= Θεραπευτική	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (Ημέρες)	Παρατηρήσεις
				ΚΑΡΠΩΝ		ΛΑΙΜΟΥ - ΡΙΖΩΝ						
				ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ	ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ							
Bacillus amyloliquefacier							•	---	Π, Θ	1-6 / 5	0	
Bordeaux mixture	•		•				•	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή βορδιγάλειου πολτού	Π	4	21	
Copper oxide		•	•	•			•	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή υποξειδίου του χαλκού	Π	3	21	
Copper hydroxide	•	•	•	•			•	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού	Π	3	21	
Copper oxychloride	•	•	•	•			•	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού	Π	3	21	
Tribasic copper sulfate	•		•	•			•	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή τριβασικού θειικού χαλκού	Π	3	21	
Candida oleophila str. O				•				Μικροοργανισμός	Π, Θ	1	-	Μετασυλλεκτική εφαρμογή
Dimethomorph					•			Αμίδια του κινναμικού οξέος	Π, Θ	2 / 14	14	Μόνο σε Πορτοκάλια
2-phenylphenol				•				Φαινόλες	Π	1	-	Μετασυλλεκτική εφαρμογή: (μόνο σε Πορτοκάλια – Λεμόνια)
Fosetyl				•	•			Φωσφονικών	Π, Θ	(3 ή 4)*	(3 ή 15)*	* Ανάλογα έγκριση σκευάσματος ** Φυτώρια (Λεμ./Πορτ./Μαντ.)
Fludioxonil				•				Φαινυλοπυρρόλων	Π	1	-	Μετασυλλεκτική εφαρμογή
Imazalil				•				Ιμιδαζολών	Π, Θ	1	-	Μετασυλλεκτική εφαρμογή

Εγγυημένη Σύμβαση	ΚΟΡΥΦΟΞΗΡΑ	ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ	ΚΑΠΝΙΑ	ΣΗΨΕΙΣ			Χημική Ομάδα	Δράση Π= Προληπτική, Θ= Θεραπευτική	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (Ημέρες)	Παρατηρήσεις
				ΚΑΡΠΩΝ	ΛΑΙΜΟΥ - ΡΙΖΩΝ						
					ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ	ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ					
			ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ								
Metalaxyl				•			Φαινυλαμίδια	Π, Θ	3	14	* <u>Προσοχή στην έγκριση του σκευάσματος / καλλιέργεια</u>
Plants oils / Clove oil				•			(Σε συνδυασμό με άλλη Χ.Ο.)	Π, Θ	1	1	Μετασυσπαστική εφαρμογή
Pyraclostrobin				•	•		Στρομπιλουρίνες	Π, Θ	4 / 14	7	• <u>ΟΧΙ</u> σε Λεμόνια
Pyrimethanil				•			Ανιλινοπυριμιδινών	Π, Θ	1	1	Μετασυσπαστική εφαρμογή * Προσοχή στην έγκριση /σκεύασμα
Potassium phosphonates					•		Ανόργανο άλας	Π	2/20	15	Τηρείτε διάστημα επανεισόδου
Sulphur								Π	8 / 7	-	
Trichoderma asperellum Trichoderma atroviride Trichoderma gamsii						•	Με βάση από επιλεγμένα στελέχη μυκήτων με ανταγωνιστική δράση σε εδαφογενείς φυτοπαθογόνους μύκητες εδάφους	Π	2 / -	3	Ειδικότερη εφαρμογή : • <u>Πριν και κατά τη μεταφύτευση</u> • <u>Σε εγκατεστημένες φυτείες - Δε συνδυάζεται (βλ. ετικέτα)</u>
Thiabendazole				•			Βενζιμιδαζολικά	Π, Θ	1	-	Μετασυσπαστική εφαρμογή

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ / ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (Καν. 1107/2009 ΕΕ)

Για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος: Διαβάζετε σχολαστικά τις ετικέτες στις συσκευασίες των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ). Εφαρμόζετε με σύνεση τα ΦΠ, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες χρήσης και τους Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Συνδυαστική χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων, περιορίζει τις προσβολές και μειώνει τον αριθμό των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες. Εφαρμόζετε εναλλαγή μεταξύ των ΦΠ (διαφορετικές χημικές ομάδες) όπου αυτό είναι δυνατό, με σκοπό την αποφυγή στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Διαχειριστείτε τις κενές συσκευασίες με σεβασμό προς το περιβάλλον. Για νέες εγκρίσεις, τροποποιήσεις ή ανακλήσεις ΦΠ, μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (<https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul>).

Η Προϊσταμένη

Ευαγγελία Σακκούλη
Γεωπόνος