



Γιαννιτσά 26-07-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Φυτ/σίας & Π.Ε. Γιαννιτσών
Ταχ. Δ/ση: Πλ. ΠΙΚΠΑ
Πληροφορίες: Π. Γεωργίου – Δ. Τσιμενίδης
Τηλ.: 23820 84413
Fax.: 23820 20466
<http://www.pella.gr>
e-mail: u12510@minagric.gr

Α.Π.: 7598

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΚΟΙΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΜΟΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Λ. Συγγρού 150
17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τ.Θ. 436
Τ.Κ. 570 01
ΘΕΡΜΗ

**1 ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ**

1 Στόχοι

- 1.1 Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στο σωστό καλλιεργητικό χρόνο.
- 1.2 Αφορά το διάστημα “Ανθοφορίας - Καρποφορίας” με σκοπό τη οργάνωση της αυτοάμυνας της βαμβακοφυτείας για την υπάρχουσα καλλιεργητική περίοδο.

2 Διαπιστώσεις

- 2.1 Οι φυτείες αυτή την εποχή βρίσκονται στο στάδιο “Ανθοφορίας - Καρποφορίας”, έχοντας ήδη καρποδέσει το 50 - 60% των καρυδιών τους.
- 2.2 Μέχρι στιγμής, από τις δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται, δεν έχουν διαπιστωθεί προσβολές ή ανάπτυξη πληθυσμού Πράσινου και Ρόδινου σκουληκιού.
- 2.3 Δεν έχουμε μέχρι τώρα την ανάπτυξη επιζήμιων πληθυσμών άλλων εχθρών του βαμβακιού.

3 Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές.

Επειδή τη περίοδο αυτή αναμένουμε την έναρξη δραστηριοποίησης της 2ης γενιάς του Πράσινου σκουληκιού στο βαμβάκι, οι βαμβακοπαραγωγοί

πρέπει να ελέγχουν τις φυτείες 1-2 φορές την εβδομάδα και αν διαπιστώσουν προσβολές να ενημερώσουν την Υπηρεσία και τον γεωπόνο που παρακολουθεί την καλλιέργειά τους, για να τους δοθούν κατάλληλες οδηγίες καταπολέμησης.

4

Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Προς το παρόν και με βάση τα στοιχεία παρατήρησης που υπάρχουν δεν χρειάζονται ψεκασμοί, αλλά πρέπει να υπάρχει συνεχής εποπτεία και δειγματοληψία από τον κάθε παραγωγό.

Ειδικά για το πράσινο σκουλήκι θα πρέπει να γίνεται προσδιορισμός του ποσοστού των νεαρών προνυμφών κατά την τυχαία δειγματοληψία 100 φυτών στο χωράφι, και **μόνο αν το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από 4% να εφαρμόζεται ψεκασμός.** Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε τους άσκοπους και άκαιρους ψεκασμούς.

Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια του βαμβακιού και όπου υπάρχει έξαρση προσβολής να χρησιμοποιούνται μαζί με τα άλλα εντομοκτόνα και ρυθμιστές ανάπτυξης.

Οι ψεκασμοί να γίνονται απογευματινές ή βραδινές ώρες όταν δεν πετούν μέλισσες, για να μην έχουμε ζημιά στα μελισσοσμήνη των μελισσοπαραγωγών μας.

Ο Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής Πέλλας

Τρύφων Τσαντάκης

Πίνακας Διανομής:

1. Δήμος Πέλλας
2. Εκκοκκιστήρια περιοχής Γιαννιτσών
3. Καταστήματα Γεωργικών φαρμάκων περιοχής Γιαννιτσών
4. Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης