

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ **2017**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ της ΔΑΟΚ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εισηγητές: Παναγιώτης Μακρής
Χρυσόστομος Σίσκος

ΧΩΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ.Ε. ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ

A: Άνω ρους Βοιωτικού Κηφισού

B: Μέσω ρους Βοιωτικού Κηφισού - Κωπαΐδα

Γ: Κάτω ρους Βοιωτικού Κηφισού - Θήβα



Αριθμός σημείων τοποθετούμενων
παγίδων στην ΠΕ Βοιωτίας:

10 για το πράσινο και 10 για το ρόδινο

Καλλιεργούμενα στρέμματα στη

Βοιωτία :

Περίπου 180.000

Περίοδος σποράς :

Αρχές Απριλίου έως τέλος Μαΐου

Περίοδος προσβολών :

μέσα Αυγούστου

Σημεία επικινδυνότητας στη Βοιωτία:

- 1)Κωπαΐδα, μεταξύ δυο διωρύγων
(Κεντρικής και Εσωτερικής)
λόγω διαφορετικού μικροκλίματος
- 2)Περιμετρικά (πχ Κάστρο), πρόβλημα με
πράσινο
- 3)Κάτω ρους (πχ Βάγια, 90, Πλαταιές)
οψίμιση παραγωγής, εμφάνιση
πράσινου σκουληκιού.

Δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται και αξιολόγησή τους:

1. Chlorpyrifos, μέτρια αποτελεσματικότητα.
2. Chlorpyrifos-methyl, καλή αποτελεσματικότητα, ασύμφορο οικονομικά.
3. Deltamethrin, μέτρια αποτελεσματικότητα.
4. Spinosad, καλή αποτελεσματικότητα, όμως ασύμφορο οικονομικά.
5. Propargite, καλή αποτελεσματικότητα.
6. Chlorantraniliprole καλή αποτελεσματικότητα.

Εμφάνιση - προσβολές από Helicoverpa armigera στη Βοιωτία

- Χρονικά, στις περιοχές που βρίσκονται μεταξύ του άνω ρου και περιμετρικά του Κωπαϊδικού πεδίου, η εμφάνιση γίνεται νωρίτερα.
- Στην κεντρική Κωπαΐδα και ειδικά μεταξύ Κεντρικής και Εσωτερικής διώρυγας λόγω βύθισης εμφανίζεται οψιμότερα το πράσινο και με μεγαλύτερους πληθυσμούς.

- Στον Κάτω ρου και ειδικά στις περιοχές Τ/κ Θεσπιών, Καταρελλίου, Λεύκτρων και Πλαταιών καθώς και στην Τ/κ Βαγίων λόγω οψίμισης της σποράς υφίσταται αντίστοιχα όψιμη εμφάνιση και προσβολή.

Εμφάνιση - προσβολές από Pectinofora gossypiella στη Βοιωτία

- Δεν εμφανίζονται ιδιαίτερες προσβολές από ρόδινο στην ΠΕ Βοιωτίας.

Ο βαθμός που οι
βαμβακοκαλλιεργητές ακολούθησαν
τις προτάσεις των Δελτίων Γεωργικών
Προειδοποιήσεων στην Π.Ε. Βοιωτίας
είναι αρκετά υψηλός (πάνω από το
μέσο όρο) και εάν αναλογιστεί κανείς
ότι το πρόγραμμα στην Βοιωτία
εφαρμόζεται τα τελευταία έξι χρόνια, η
επιτυχία του παίρνει μεγαλύτερες
διαστάσεις.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

- Να γίνεται στελεχοκοπή και όργωμα
- Να γίνεται προσπάθεια ομαδοποίησης των καλλιεργουμένων ποικιλιών από τους παραγωγούς ανά περιοχή (πρώιμες, μεσοπρώιμες, όψιμες) ώστε να εφαρμόζονται μαζικότεροι ψεκασμοί βάσει των Δ.Γ.Π.
- Να γίνεται μεγαλύτερη ενημέρωση μέσω των ΜΜΕ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ.

Π. Μακρής

Χ. Σίσκος