



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 4 - 1 - 2010
Αριθ. πρωτ: 180263

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228

Προς: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου
Τ.Κ. 152 32 Χαλάνδρι-Αθήνα
(με απόδειξη)

e-mail: syg064@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.
7437/29-3-1993 έγκρισης στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν RUSH
25 WG (ζιζανιοκτόνο) ως προς το
φάσμα δράσης, και τις ειδικές
γεωργικές συνθήκες.»

- Κοιν.:
1. Γραφείο Υπουργού κ. Αικ.
Μπατζελή
 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μ.
Καρχιμάκη
 3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας - Έδρες τους
 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους
 6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
 7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Τη με αριθ. 122109/12-10-2006 (ΦΕΚ 1638/Β/8-11-2006) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «καταχώριση της δραστικής ουσίας Rimsulfuron στο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος υπ' αριθ. 115/1997 Προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως

έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/39/EK της Επιτροπής της 12^{ης} Απριλίου 2006".

3. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214 Α').
4. Τη με αριθ. 316049/24-11-2009 (ΦΕΚ 2401/Β'/1-12-2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη».
5. Τη με αριθ. πρωτ. 132864/1-10-2009 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας **NTY PONT ELLAS A.E.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την με αριθ. 7437 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος RUSH 25 WG που χορηγήθηκε με την αριθ. 68371/29.3.1993 Απόφασή μας, διευρύνθηκε με την αριθ. 106887/11-9-2002 και τροποποιήθηκε με την αριθ. 124656/18-11-2008 απόφαση, ως προς το φάσμα δράσης (παρατηρήσεις) και τις ειδικές γεωργικές συνθήκες (σημεία 5 και 6) και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:**

5.1 Φάσμα δράσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. (*) Η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού σε αναλογία 0,1% κατ' όγκο είναι απαραίτητη για την άριστη δράση του ζιζανιοκτόνου.
2. Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασμός γίνεται όταν τα περισσότερα ζιζάνια έχουν φυτρώσει και βρίσκονται σε μικρό στάδιο ζωικής ανάπτυξης και ειδικότερα:
Ετήσια αγρωστώδη: Από το στάδιο του 1^{ου} φύλλου μέχρι την αρχή του αδελφώματος των ζιζανίων.
Πολυετή αγρωστώδη: Για να αποφευχθούν αναβλαστήσεις (π.χ. βέλιουρας από ριζώματα) όταν έχουν ύψος 20-35 εκ. δηλ. 5-8 φύλλα.
Πλατύφυλλα: στο στάδιο 2-4 φύλλων.
3. Υγρασία του εδάφους και ζεστός καιρός επιταχύνουν τη δράση του ενώ μεγάλη ξηρασία και πολύ κρύο την επιβραδύνουν.
4. Δεν χρειάζεται επανάληψη του ψεκασμού αν βρέξει αφού περάσουν 3-4 ώρες από τον ψεκασμό.
5. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας.
6. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο (καλαμπόκι, πατάτα, τομάτα): 2
7. Μέγιστη δόση ανά καλλιεργητική περίοδο (γραμ. σκευάσματος/στρέμμα): καλαμπόκι 5, πατάτα 9, Τομάτα 11.

- | | |
|--|--|
| 6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να | Η συνεχής χρήση στον ίδιο αγρό ζιζανιοκτόνων που έχουν παρόμοιο τρόπο δράσης οδηγεί συχνά στην επιλογή ανθεκτικών βιοτύπων ζιζανίων στα χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα. Τέτοιοι βιότυποι αν δεν καταπολεμηθούν πολλαπλασιάζονται γρήγορα και επικρατούν έναντι των ευαίσθητων βιοτύπων.
Ένας βιότυπος ενός ευαίσθητου ζιζανίου θεωρείται ανθεκτικός σε κάποιο ζιζανιοκτόνο όταν επιβιώνει μετά από ορθή εφαρμογή της |
|--|--|

αποκλειστεί

συνιστώμενης δόσης του.

Η ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων ενός είδους ζιζανίου μπορεί να αποφευχθεί ή να επιβραδυνθεί με την εναλλαγή (ή ανάμιξη) αποτελεσματικών ζιζανιοκτόνων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα:

SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

SZ3 Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από καλαμπόκι, πατάτα, τομάτα, πριν περάσουν 90 μέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

SZ5 Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

SZ7 Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.

SZ8 Μην διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.

SZ9 Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2.5 ατμ. (40 psi).

SZ10 Χρησιμοποιείτε μπέκ τύπου σκούπας

SZ11 Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες για τις οποίες δεν συστήνεται

II. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 124656/18-11-2008 απόφασή μας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

M. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ