



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 6-12-2010

Αριθ. πρωτ.: 191351

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11  
FAX: 210 92 12 090  
E-mail: [syg046@minagric.gr](mailto:syg046@minagric.gr)

ΠΡΟΣ: 1. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Υπηρεσίες Γεωργίας - Έδρες τους  
2. Π.Κ.Π.Π. & Π.Ε. - Έδρες τους  
3. Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσής μας

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
4. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής  
Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής  
κ. Δ. Μπαμπίλη  
5. Μ.Φ.Ι.  
Τμήμα Εντομολογίας και Γεωργικής  
Ζωολογίας  
6. Ινστιτούτο Προστ. Φυτών Ηρακλείου  
Μέσα Κατσαμπά  
711 10 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
(υπ' όψη κ. Ν. Ροδιτάκη)  
7. Τμήματα Β΄, Γ, Ε΄ της Δ/σής μας  
8. Ε.ΣΥ.Φ.

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση κατ’ εξαίρεση έγκρισης  
διάθεσης στην αγορά  
εντομοκτόνων σκευασμάτων με  
βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.Δ.  
115/97, για την πρόληψη και τον  
περιορισμό της εξάπλωσης του  
εντόμου *Rhynchophorus*  
*ferrugineus* (Olivier) στα  
φοινικοειδή, σε εφαρμογή της  
Απόφασης 2007/365/ΕΚ, όπως  
ισχύει”

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

### ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α΄/30.5.1997) “Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί”.
2. Τη με αριθ. 2007/365/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής με θέμα “προσωρινά έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)”, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 2008/776/ΕΚ και 2010/467/Ε.Ε. Αποφάσεις της Επιτροπής.
3. Το από 04-11-2010 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
4. Τη γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) της 7<sup>ης</sup>/2010 συνεδρίασής του που αφορά το ανωτέρω θέμα.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (Β΄ 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη – Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο”.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Σε εφαρμογή της με αριθ. 2007/365/ΕΚ Απόφασης της Επιτροπής, όπως ισχύει, χορηγούμε κατ' εξαίρεση έγκριση διάθεσης στην αγορά με βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115/1997 στα ακόλουθα εντομοκτόνα σκευάσματα, για την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης του εντόμου *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) στα φοινικοειδή:

α) **ACTARA 25 WG** (δραστική ουσία thiamethoxam, αριθμός έγκρισης 14103).

β) Σκευάσματα με δραστική ουσία **imidacloprid**, περιεκτικότητα 20% β/ο ή 20,6% β/ο και μορφή υγρό διάλυμα (SL).

γ) Σκευάσματα με δραστική ουσία **cypermethrin**, περιεκτικότητα 10% β/ο και μορφή υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC).

δ) **VERTIMEC 1,8 EC** (δραστική ουσία abamectin, αριθμός έγκρισης 1719).

Τα στοιχεία της κατ' εξαίρεση διάθεσης στην αγορά θα είναι τα εξής:

### 1) Δόσεις-τρόποι εφαρμογής:

#### **ACTARA 25 WG:**

-Ψεκασμοί κάλυψης: δόση εφαρμογής 40 γραμ. σκευάματος/100 lt ψεκ. υγρού (κατ' ανώτατο όριο 400 γραμ./εκτάριο και εφαρμογή), δύο εφαρμογές max με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.

-Ριζοπότισμα: δόση εφαρμογής 40 γραμ. σκευάματος/100 lt ψεκ. υγρού, 1 εφαρμογή.

Έγχυση στον κορμό: 5-20 γραμ. ανά δένδρο, ανάλογα με το μέγεθός του. Δύο εφαρμογές max με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.

#### **IMIDACLOPRID 20 SL ή 20.6 SL:**

-Ψεκασμοί κάλυψης: 50-75 κ.εκ. σκευάματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού

-Ριζοπότισμα: δόση εφαρμογής 0,8-1 lt σκευάματος/στρ., με δύο εφαρμογές max και μεσοδιάστημα 30-40 ημέρες.

Έγχυση στον κορμό: 4-10 κ.εκ. ανά δένδρο, ανάλογα με το μέγεθός του. Δύο εφαρμογές max με μεσοδιάστημα 45-55 ημέρες. Στην περίπτωση της εφαρμογής με έγχυση δεν παρασκευάζουμε ψεκαστικό υγρό αλλά το προϊόν εφαρμόζεται (εγχύεται) αδιάλυτο.

#### **CYPERMETHRIN 10% EC:**

-Ψεκασμό κάλυψης στο κομμένο φυτό και στα κομμένα τεμάχια του φυτού κατά τη διαδικασία της κοπής: 40-60 κ.εκ. σκευάματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού

#### **VERTIMEC 1,8 EC:**

Έγχυση στον κορμό κατά την περίοδο μετακίνησης του εντόμου: 20-80 ml αδιάλυτου προϊόντος ανά δένδρο (ανάλογα με το μέγεθός του), δύο εφαρμογές με μεσοδιάστημα 15-45 ημερών.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να λαμβάνονται και άλλα μέτρα π.χ. μηχανική εξυγίανση, χρήση βιολογικών παραγόντων κ.λ.π. όπως προβλέπεται και στη φυτουγειονομική νομοθεσία.

2) **Όροι και προϋποθέσεις για την κατ' εξαίρεση έγκριση διάθεσης των σκευασμάτων:** Τα σκευάσματα θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις προφυλάξεις και οδηγίες χρήσεις που αναγράφονται στις εγκρίσεις κυκλοφορίας τους, όπως ισχύουν σήμερα, και σύμφωνα με τη φυτουγειονομική νομοθεσία.

3) **Διαπίστωση του προβλήματος-εφαρμογή των σκευασμάτων:** η εφαρμογή των σκευασμάτων θα γίνεται παρουσία Γεωπόνου, ο οποίος θα επιβεβαιώνει την προσβολή από το *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), θα επιβλέπει την κοπή και κάψιμο των φοινικοδένδρων και θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των σκευασμάτων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης.

**4) α) Μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης:**

- **Κατά την κοπή των φυτών:** ψεκάσμος κάλυψης με thiamethoxam ή imidacloprid ή cypermethrin στο κομμένο φυτό, στα κομμένα τεμάχια του φυτού, στη θέση κοπής του φυτού και στον τόπο γύρω από τη θέση κοπής.
- **Στο χώρο διατήρησης των ευπαθών φυτών (φυτώρια):** σε περίπτωση που υπάρχουν ύποπτα σημεία προσβολής στο χώρο ή στη γύρω περιοχή, προληπτική εφαρμογή με ψεκάσμο κάλυψης των φυτών με thiamethoxam ή imidacloprid. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: δύο (2).

**β) Μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης (στην περίπτωση που επιβάλλεται να ληφθούν από την φυτοϋγειονομική νομοθεσία):**

- Ριζοπότισμα, με διασυστηματικό εντομοκτόνο (thiamethoxam, imidacloprid).
- Εγχύσεις στην περιοχή της στεφάνης ή στον κορμό των φοινικοδένδρων με διασυστηματικό εντομοκτόνο (thiamethoxam, imidacloprid, VERTIMEC).

Οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής με έγχυση:

- α) μετριέται η περίμετρος του κορμού
- β) ανοίγεται με τρυπάνι κατάλληλη οπή στον κορμό
- γ) το βάθος της οπής πρέπει να είναι ίσο με το 1/3 της περιμέτρου του κορμού σε αυτό το σημείο και το πλάτος της να είναι περίπου 1 εκ.
- δ) στην οπή που έχει δημιουργηθεί τοποθετείται κατάλληλη ειδική βαλβίδα εισροής που προστατεύει τους ιστούς του φοίνικα από κρυπτόγαμα παθογόνα και εμποδίζει την εκροή του υλικού. Η βαλβίδα παραμένει μετά το τέλος της εφαρμογής και για μεταγενέστερες εφαρμογές.
- ε) Η ποσότητα που εγχύεται είναι ανάλογη με τον όγκο του φυτού (βλ. παρ. 1-δόσεις εφαρμογής).
- στ) Η έγχυση του υλικού γίνεται αργά και προσεκτικά για να μην υπάρξουν απώλειες.
- ζ) Τα δένδρα στα οποία έγινε η εφαρμογή επισημαίνονται με ανεξίτηλα καρτελάκια. Καταγράφονται σε πρωτόκολλα η ημερομηνία εφαρμογής, η ποσότητα που εγχύθηκε και οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες.

**5) Γνωστοποίηση ενεργειών στην Υπηρεσία:** οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στις οποίες έγινε εφαρμογή εντομοκτόνου σκευάσματος σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς και οι αρμόδιοι Γεωπόνοι των Δήμων ή Κοινοτήτων (σε περίπτωση που η εφαρμογή έγινε σε κοινόχρηστους χώρους), υποχρεούνται να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Το σκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε.
- Η ποσότητα που απαιτήθηκε.
- Ο αριθμός των δένδρων ή των κομμένων δένδρων που ψεκάστηκαν.
- Έκθεση βεβαίωσης του γεωπόνου που επιβεβαίωσε το πρόβλημα και επέβλεψε τη διαδικασία.

**6) Περίοδος ισχύος της Απόφασης:** 120 ημέρες από την υπογραφή της.**7) Περιορισμοί – Απαγορεύσεις - Προφυλάξεις:**

Ισχύουν οι αναγραφόμενοι περιορισμοί - απαγορεύσεις – προφυλάξεις της έγκρισης κυκλοφορίας κάθε σκευάσματος όπως ισχύει σήμερα, που αναγράφονται στην ετικέτα του.

Πλέον των ανωτέρω, να εφαρμοστούν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

## Α) Τήρηση ζωνών ασφαλείας από τα επιφανειακά ύδατα:

Δραστική ουσία	Εφαρμογή με ψεκασμό	Εφαρμογή με ριζοπότισμα	Εφαρμογή με έγχυση
thiamethoxam	10 μέτρα	Δεν απαιτείται	Μη προτεινόμενη χρήση
Imidacloprid	30 μέτρα	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται
Cypermethrin*	30 μέτρα	Μη προτεινόμενη χρήση	Μη προτεινόμενη χρήση
VERTIMEC	Μη προτεινόμενη χρήση	Μη προτεινόμενη χρήση	Δεν απαιτείται

\*: εφαρμογή μόνο στο κομμένο φυτό, στα κομμένα τεμάχια του φυτού, στη θέση κοπής του φυτού και στον τόπο γύρω από τη θέση κοπής

- Β)** Πριν από την εφαρμογή σε κοινόχρηστους χώρους, οι Δήμοι υποχρεούνται να προειδοποιούν τους περιοίκους για την επικείμενη εφαρμογή.
- Γ)** Τόσο οι Δήμοι όσο και οι ιδιώτες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την επισήμανση των περιοχών όπου έγινε εφαρμογή.
- Δ)** Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής να μην εισέρχονται άνθρωποι (πλην του ψεκαστή) και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή.
- Ε)** Σε κοινόχρηστους χώρους να μην εισέρχονται άτομα και κατοικίδια ζώα μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.
- ΣΤ)** Για την επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον υπεύθυνο Γεωπόνο οι ιδιαιτερότητες του χώρου που θα γίνει η εφαρμογή (π.χ. γειτνίαση με πάρκα, πλατείες, οικείες κλπ) καθώς και η τυχόν έντονη δυσάρεστη οσμή ορισμένων σκευασμάτων.
- Ζ)** Η εφαρμογή των σκευασμάτων σε κοινόχρηστους χώρους θα πραγματοποιείται με ευθύνη των κατά τόπους Δήμων και Κοινοτήτων, ενώ σε ιδιωτικούς χώρους με ευθύνη των ενδιαφερόμενων, οι οποίοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του υπεύθυνου Γεωπόνου που επιβλέπει τη διαδικασία.
- Η)** Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση φερομονικών παγίδων, αυτή να γίνεται μόνο με το συντονισμό των αρμοδίων τοπικών αρχών.
- Θ)** "Απαγορεύεται η εφαρμογή έγχυσης με μεθόδους που απαιτούν μόνιμη εγκατάσταση ψεκαστικού συστήματος στα φοινικόδενδρα".

**Ι) Προστασία μελισσών:**ACTARA:

μην εφαρμόζετε το σκεύασμα στα φοινικόδενδρα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας.

Μην εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην περιοχή εφαρμογής

VERTIMEC:

για την προστασία των μελισσών απομακρύνετε ή καλύψτε τα μελίτσια όσο διαρκεί η εφαρμογή και για 1-2 ώρες μετά από αυτή

ή

η εφαρμογή να γίνεται σε ώρες κατά τις οποίες οι μέλισσες δεν βρίσκονται στο χώρο (αργά το απόγευμα ή το ξημέρωμα)

Μην εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην περιοχή εφαρμογής

IMIDACLOPRID:

Μην εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην περιοχή εφαρμογής

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στους φοίνικες για καλλωπιστική χρήση κόψτε τα άνθη πριν την εφαρμογή.

- 8) **Φυτοτοξικότητα:** στην περίπτωση προληπτικής εφαρμογής στο χώρο διατήρησης των ευπαθών φυτών (φυτώρια) καθώς και στην περίπτωση εφαρμογής για τον περιορισμό της εξάπλωσης, να γίνεται αρχικά δοκιμαστική εφαρμογή του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί σε μικρή έκταση, για την αποφυγή κινδύνου φυτοτοξικότητας.
- 9) **Γενικές υποχρεώσεις:** Οι Δήμοι, οι Κοινότητες και οι ιδιώτες που θα εφαρμόσουν σκευάσματα για τον έλεγχο του *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον, που θα περιέλθουν σε γνώση τους, από την εν λόγω χρήση των προϊόντων. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ