

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.224948, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

Παρατηρήσεις υπαίθρου: Σ. Λούρου, Μαρία Ροδιτάκη


Nº 3



Κόκκινη ψώρα



Παρλατόρια ή Μαύρη ψώρα



Διαλευρώδης Προνύμφες
και ακμαία στην κάτω επιφάνεια
των φύλλων.



Φυλλοκνίστης: Ελικοειδείς στοές
και καρούλιασμα των φύλλων.



Eutetranychus orientalis:
Σταχτόχρωμη όψη, αποικίες
στην κεντρική νεύρωση στην
επάνω επιφάνεια των φύλλων.



Ψευδόκκοκος: Προσβολή στα
σημεία επαφής των καρπών.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (<i>Ceratitis capitata</i>) Οδηγίες:	Οι πληθυσμοί της μύγας παρέμειναν υψηλοί από το Μάιο μέχρι σήμερα σημειώνοντας αντίστοιχα αξιόλογες προσβολές στις όψιμες ποικιλίες εσπεριδοειδών και άλλων καρποφόρων ξενιστών της. Ο κίνδυνος προσβολής ώριμων καρπών είναι αυξημένος, δεν προσβάλλει τους ανώριμους καρπούς. – <u>Να συνεχιστεί η προστασία στα ασυγκόμιστα όψιμα πορτοκάλια και γκρεια φρουτ.</u> Προσβεβλημένοι καρποί να απομακρύνονται και να καταστρέφονται.
ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ (<i>Aonidiella aurantii</i>) ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ Μαύρη ψώρα (<i>Parlatoria zizyphi</i>) ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ (<i>Lepidosaphes beckii</i>) Οδηγίες:	Η <u>δεύτερη γενιά</u> κοκκοειδών είναι σε εξέλιξη. Τα προνομφικά στάδια (<u>κινητές μορφές</u>), ευαίσθητα βιολογικά στάδια στη χημική καταπολέμηση, βρίσκονται στα μέγιστα των πληθυσμών τους. Υψηλή σχετική υγρασία και πυκνή βλάστηση ευνοούν την ανάπτυξη σοβαρών προσβολών. Καλλιεργητικές φροντίδες που στοχεύουν στην είσοδο αέρα και φωτός στο περιβάλλον των δέντρων μειώνουν την υγρασία και περιορίζουν την εξέλιξη της προσβολής. – <u>Όπου διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές συστήνεται άμεσα επέμβαση με εγκεκριμένα εκλεκτικά σκευάσματα με ήπια δράση στα ωφέλιμα έντομα (παρασιτοειδή, αρπακτικά).</u> – <u>Όταν χρησιμοποιείτε παραφινικά λάδια απαιτείται προσοχή λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών των ημερών που ακολουθούν. Αποφύγετε τη χρήση τους όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 30°C. Τα δέντρα πρέπει να είναι επαρκώς ποτισμένα, σε καλή θρεπτική κατάσταση, χωρίς θερμικό στρες.</u>
ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ: (<i>Planococcus citri</i>) Συμπτώματα: Οδηγίες: Σύσταση:	Προσβάλλει καρπούς, κλαδιά και φύλλα που βρίσκονται σε σκιερά μέρη του δέντρου όπου η υγρασία είναι αυξημένη. Σχηματίζει αποικίες καλυμμένες με λευκά κηρώδη νήματα και μελιτώματα. Εγκαθίσταται σε θέσεις προφυλαγμένες, συνήθως στα σημεία επαφής μεταξύ καρπών ή φύλλων και κλαδιών, στον κάλυκα ή στον ομφαλό ομφαλοφόρων ποικιλιών. Τα μελιτώματα ρυπαίνουν τους καρπούς και υποβαθμίζουν την ποιότητά τους λόγω ανάπτυξης μυκήτων της καπνιάς. – Συνιστάται κλάδεμα, καθαρισμοί και αραίωμα της βλάστησης στα προσβεβλημένα δέντρα. – <u>Όταν μετά από έλεγχο διαπιστώνεται προσβολή νεαρών καρπών μεγαλύτερη από 10% συστήνεται επέμβαση με εγκεκριμένα εκλεκτικά σκευάσματα.</u> – <u>Όπου συνυπάρχει με κοκκοειδή να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση.</u>
ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ: (<i>Phyllocnistis citrella</i>) Οδηγίες:	Οι προσβολές εντείνονται σε δέντρα με άφθονη νεαρή βλάστηση. – <u>Συστήνεται αφαίρεση και απομάκρυνση λαίμαργων βλαστών, αποφυγή θερινών αζωτούχων λιπάνσεων και περιορισμός των αρδεύσεων που παρατείνουν τις περιόδους νέας βλάστησης.</u> – <u>Νεαρά δενδρύλλια σε νέες φυτεύσεις και φυτώρια να εξετάζονται για προσβολές και να είναι συνεχώς προστατευμένα ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα νεαρά εμβόλια των φυτωρίων.</u> – Στα <u>παραγωγικά δέντρα</u> οι ζημιές περιορίζονται με καλλιεργητικούς χειρισμούς, ωστόσο <u>επίπεδο ανεκτής προσβολής ορίζεται το 20% προσβεβλημένης φυλλικής επιφάνειας.</u>

ΔΙΑΛΕΥΡΩΔΗΣ: (<i>Dialeurodes citri</i>) Οδηγίες:	Παρατηρούνται προσβολές σε δέντρα με τρυφερή βλάστηση ή πυκνό φύλλωμα που συγκρατούν αυξημένη υγρασία. Φέτος λόγω ξηροθερμικών συνθηκών οι μέχρι τώρα προσβολές είναι σχετικά περιορισμένες. Οι ζημιές των αλευρωδών οφείλονται στις απομυζήσεις των χυμών από φυτικά μέρη και στα μελιτώδη εκκρίματα που ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων της καπνιάς. – Συστήνονται <u>καλλιεργητικοί χειρισμοί που μειώνουν τη σχετική υγρασία</u> στον αγρό (ισορροπημένες αρδεύσεις, περιορισμένες όψιμες λιπάνσεις, καθαρισμός και αφαίρεση των λαίμαργων βλαστών). – Διαπιστώνονται σε αυξημένους πληθυσμούς ευαίσθητα προνυμφικά βιολογικά στάδια. Σε οπωρώνες με σοβαρή προσβολή συστήνεται <u>άμεσα</u> επέμβαση με εγκεκριμένα εκλεκτικά εντομοκτόνα κατά προτίμηση χαμηλής τοξικότητας.
ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ: (<i>Eutetranychus orientalis</i>) Διαπιστώσεις: Οδηγίες:	Προσβάλλει κατά προτίμηση τις λεμονιές, φύλλα και καρπούς. Σχηματίζει αποικίες στην κεντρική νεύρωση της επάνω επιφάνειας των φύλλων. Τα φύλλα των προσβεβλημένων δένδρων αποκτούν σταχτιά όψη και οι καρποί εμφανίζουν αποχρωματισμούς. Παρουσιάζεται φυλλόπτωση στα χαμηλά κλαδιά, εξασθένιση και μειωμένη παραγωγή. – Εξετάζετε τα δέντρα, ιδιαίτερα τις λεμονιές, για χαρακτηριστικά συμπτώματα. Όταν διαπιστωθούν συμπτώματα προσβολής σε φύλλα και καρπούς συστήνεται <u>άμεση</u> αντιμετώπιση. Διαδίδεται κυρίως με τον άνεμο και τη μεταφορά προσβεβλημένων φύλλων και καρπών.

- Με την συνεργασία της ΔΑΑΚ Χανίων λαμβάνονται δεδομένα για την Π.Ε. Χανίων.
- Χρησιμοποιείτε σκευάσματα φυτοπροστασίας με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών. Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ <https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul> και στις επιλογές: **ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ENTOMO** (Εχθρό) ή **ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΘΕΝΕΙΑ** για τις καλλιέργειες (πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά, κ.ά.) μπορείτε να ενημερώνεστε για **ε γ κ κ ρ ι μ έ ν α ε ν τ ο μ ο κ τ ό ν α** και **μ υ κ η τ ο κ τ ό ν α** σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των εγκρίσεων.
- Εφαρμόζετε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα συσκευασίας κάθε σκευάσματος. Τηρείτε αυστηρά το χρόνο που αναγράφεται μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.
- Επιλέγεται εκλεκτικά σκευάσματα με ήπια και περιορισμένη δράση σε ωφέλιμα έντομα (αρπακτικά, παρασιτοειδή).
- Η πρακτική των αφέκαστων ζωνών συντελεί στη διατήρηση των ωφέλιμων εντόμων. Οι ζώνες αυτές αποτελούν το 15-20% του συνόλου των δέντρων της καλλιέργειας και εναλλάσσονται μέσα στον οπωρώνα από χρονιά σε χρονιά.
- Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών αφήνετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 21 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Ηράκλειο 7 Αυγούστου 2026

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη