

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ.Δ/ση : Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810224948 ,Fax: 2810225616

Email: pkpfhgpr@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Χρησιμοποιείτε σωστά τα φυτοφάρμακα.
Έτσι προστατεύονται:

- Ο χρήστης
- Ο καταναλωτής
- Το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

Α Μ Π Ε Λ Ι

Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μπαγκής - Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

22.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: <i>Χρόνος καταπολέμησης:</i> <i>Οδηγίες:</i>	Η τέταρτη πτήση του εντόμου έκανε την εμφάνιση της με αυξημένους κατά τόπους πληθυσμούς. Σε επιτραπέζια σταφύλια που θα συγκομιστούν όψιμα συνιστάται ψεκασμός σε όλες τις περιοχές στο διάστημα: 13 - 14 Σεπτεμβρίου. Να χρησιμοποιηθούν φάρμακα μικρής υπολειμματικής διάρκειας. Το χρονικό διάστημα μεταξύ τελευταίου ψεκασμού και συγκομιδής να τηρείται αυστηρά.
ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: <i>Διαπιστώσεις:</i> <i>Οδηγίες:</i>	<ul style="list-style-type: none">- Η ασθένεια τη φετινή περίοδο εκδηλώθηκε σε όλη την αμπελουργική ζώνη του νησιού.- Οι δροσιές της εποχής ενεργοποιούν τις παλιές κηλίδες και δίνουν νέες προσβολές.- Οι όψιμες προσβολές προκαλούν πρόωρη αποφύλλωση. Για τους παραπάνω λόγους συνιστάται να γίνει προστατευτικός ψεκασμός του φυλλώματος με χαλκούχα σκευάσματα. Σε αμπέλια που δεν έχουν συγκομιστεί, η επέμβαση να γίνει αμέσως μετά τη συγκομιδή. Συνδυασμένη επέμβαση με βρέξιμο θείο αντιμετωπίζει και τις όψιμες προσβολές του ωιδίου. Σκοπός της προστασίας του φυλλώματος είναι να αποφευχθεί η αποφύλλωση ώστε να γίνει η ξυλοποίηση των κληματίδων και να εξασφαλιστεί η συνέχεια της καλλιέργειας.
ΙΣΚΑ:	Να γίνει σήμανση των πρέμνων με συμπτώματα της ασθένειας. Τα άρρωστα πρέμνα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, να εκριζωθούν και να καούν.

Συνέχεια στην πίσω σελίδα

Ε Λ Ι Α

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ: <i>Διαπιστώσεις:</i>	<p>Στο δίκτυο παγίδευσης παρατηρείται αύξηση των πληθυσμών. Την περίοδο αυτή οι προνύμφες του εντόμου προσβάλουν, εκτός από τη βλάστηση και τους πράσινους αναπτυγμένους καρπούς.</p> <p>Σε ορισμένες τοποθεσίες παρατηρήθηκαν έντονες προσβολές σε καρπούς. Επισημαίνεται ότι οι φθινοπωρινές γενιές, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο δελτίο μας, 15°/30-6-2011, μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στην παραγωγή.</p> <p>Οι πληθυσμιακές εξάρσεις του εντόμου έχουν τοπικό και περιοδικό χαρακτήρα. Αξιόλογες προσβολές σε παραγωγικά δέντρα, συνήθως οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην παρατεταμένη αφθονία τρυφερής βλάστησης (ανανεωτικά κλαδέματα, καλλιεργητικά μέτρα με συνέπεια την αφθονία λαίμαργων βλαστών για μεγάλο μέρος της βλαστικής περιόδου, συχνά ποτίσματα, κ.α).</p>
<i>Οδηγίες:</i>	<p>Όπου διαπιστώνονται φαγώματα στη βλάστηση και στους καρπούς να γίνει άμεσα ψεκάσμός με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο. Ανάγκη προστασίας έχουν και τα φυτώρια, τα δέντρα νεαρής ηλικίας και τα αυστηρά κλαδεμένα δέντρα.</p>

ΦΑΡΜΑΚΑ: Οι επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω εχθρών και ασθενειών να γίνονται με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες που σας έχουμε αποστείλει. Διαβάστε και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η νέα διεύθυνση της υπηρεσίας είναι οδός Καστοριάς 32Α, Κατοαμπάς, Τ.Κ. 71307. Τα τηλέφωνα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) παραμένουν ίδια.

📄 Το δελτίο εμφανίζεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: www.minagric.gr

Ηράκλειο 9 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Γιάννης