

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

Ταχ.Δ/νση : Μ.Γουβερνέτου 17, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810224948 ,Fax: 2810225616

Email: pkpfhgpr@otenet.gr

**ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

Χρησιμοποιείτε σωστά τα φυτοφάρμακα.

Έτσι προστατεύονται:

- Ο χρήστης
- Ο καταναλωτής
- Το περιβάλλον

**Ε Χ Θ Ρ Ο Ι Τ Η Σ Ε Λ Ι Α Σ  
Μ Ε Σ Ο Π Ρ Ω Ι Μ Ε Σ & Ο Ψ Ι Μ Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ**

*Πληροφορίες: Μαρία Ζ. Ροδιτάκη – Νίκος Ι. Μπαγκής*

8.

**ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ:** Στις πρώιμες περιοχές ολοκληρώνεται η άνθηση της ελιάς. Οι μεσοπρώιμες περιοχές βρίσκονται λίγο πριν την έναρξη της άνθησης και οι όψιμες στο στάδιο του φουσκώματος των ανθέων.

**ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ:** Στις **μεσοπρώιμες και στις όψιμες περιοχές** η ανθόβια γενιά του  
*Διαπιστώσεις:* πυρηνοτρήτη είναι σε εξέλιξη. Οι πληθυσμοί είναι υψηλοί σε όλες τις περιοχές του δικτύου των φερομονικών παγίδων. Οι προνύμφες της ανθόβιας γενιάς καταστρέφουν τα άνθη. Βρέθηκαν ωτοκίες σε ανθοταξίες των μεσοπρώιμων περιοχών.  
*Οδηγίες:* – Στην ανθόβια γενιά συνιστάται καταπολέμηση **στην έναρξη της άνθησης**, μόνο σε ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία (μικρότερη του 50% της κανονικής). Ελαιώνες με πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία δεν έχουν ανάγκη προστασίας.  
– Στις **βιολογικές καλλιέργειες** η καταπολέμηση πρέπει να γίνεται στην ανθόβια γενιά καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα βιολογικής αντιμετώπισης της καρπόβιας γενιάς.  
– Να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σκευάσματα του Βάκιλλου της Θουριγκίας, με επανάληψη του ψεκάσμού σε 7-10 ημέρες. Η εφαρμογή τους δεν βλάπτει τα ωφέλιμα έντομα που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή.

<p><b>ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ - ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ :</b></p> <p><i>Χρόνος επέμβασης:</i></p>	<p>Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοκκοειδών συνιστάται αραίωμα της κόμης των δέντρων, αποφυγή άσκοπων αρδεύσεων και υπερβολικών αζωτούχων λιπάνσεων.</p> <p>Όπου παρατηρούνται σοβαρές προσβολές να γίνει καταπολέμηση:</p> <p>– <u>Μεσοπρώιμες περιοχές</u> : <b>20 - 24 Μαΐου.</b></p> <p>– <u>Όψιμες περιοχές</u>: <b>26 - 30 Μαΐου.</b></p>
<p><b>ΠΟΛΛΙΝΙΑ:</b></p> <p><i>Διαπιστώσεις:</i></p> <p><i>Οδηγίες:</i></p> <p><i>Χρόνος επέμβασης:</i></p>	<p>Οι προσβολές της συνεχώς επεκτείνονται. Προσβάλλει δέντρα παραμελημένα ή εξασθενημένα. Είναι κοκκοειδές που αναπτύσσεται κυρίως σε πληγές ή σκασίματα του φλοιού, στις μασχάλες των διακλαδώσεων και στα μάτια. Λόγω της απομύζησης των χυμών μειώνει τη νέα βλάστηση (μικρού μήκους βλαστοί, μικροφυλλία) και προκαλεί νέκρωση των λεπτών κλαδιών. Τα μελιτώδη απεκκρίματα της ευνοούν την ανάπτυξη της καπνιάς.</p> <p>Καλλιεργητικές φροντίδες όπως η εξυγίανση των δέντρων με αφαίρεση των προσβεβλημένων και εξασθενημένων κλαδιών, η βελτίωση της ζωτικότητας και η διατήρηση της καλής θρεπτικής τους κατάστασης είναι αποτελεσματικότερες από τις χημικές επεμβάσεις.</p> <p>– <u>Μεσοπρώιμες περιοχές</u> : <b>20 - 24 Μαΐου.</b></p> <p>– <u>Όψιμες περιοχές</u>: <b>26 - 30 Μαΐου.</b></p>
<p><b>ΨΥΛΛΑ :</b> <b>(ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ)</b></p>	<p>Στις <b>μεσοπρώιμες και στις όψιμες περιοχές</b>, μειωμένη ανθοφορία και έντονη προσβολή στις ανθοταξίες (πάνω από 30% στο σύνολο των ανθέων) δικαιολογούν <u>άμεσο ψεκασμό</u> με εγκεκριμένο εντομοκτόνο. Για να είναι αποτελεσματική η επέμβαση θα πρέπει να προστεθεί ειδικό διαβρεκτικό στο εντομοκτόνο, ώστε το διάλυμα να διαπερνά τα κηρώδη νημάτια και να φτάνει στις νύμφες του εντόμου. Σε ελαιώνες με ικανοποιητική ανθοφορία δεν συνιστάται καταπολέμηση.</p>

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:** Οι επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω εχθρών να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας έχουμε αποστείλει.

- Να προτιμηθούν σκευάσματα με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα (παράσιτα, αρπακτικά) που βρίσκονται σε υψηλούς πληθυσμούς αυτή την εποχή.
- Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των φαρμάκων πριν τη χρήση.

📧 Το δελτίο εμφανίζεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) .

Ηράκλειο 17 Μαΐου 2011  
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  
Τρουλλάκης Γιάννης