

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ.Δ/ση : Μ.Γουβερνέτου 17, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810224948 ,Fax: 2810225616

Email: pkpfhgpr@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείτε σωστά τα φυτοφάρμακα.
Έτσι προστατεύονται:

- Ο χρήστης
- Ο καταναλωτής
- Το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μπαγκής - Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

9.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:	<ul style="list-style-type: none">- Συμπτώματα σε όλες τις ζώνες καλλιέργειας του αμπελιού (πρώιμες, μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές).
<i>Διαπιστώσεις:</i>	<ul style="list-style-type: none">- Στις συνθήκες της Κρήτης οι δροσιές του Μαΐου είναι σοβαρός επιδημιολογικός παράγοντας για την εξαπλώση της ασθένειας.- Την περίοδο που διανύουμε <u>η ασθένεια μπορεί να προσβάλλει κατευθείαν τα σταφύλια</u> μετά από σύντομες βροχές ή μικρό χρόνο διαβροχής των φύλλων.
<i>Οδηγίες:</i>	<ul style="list-style-type: none">- Τα ευαίσθητα στάδια μούρου - άνθησης - καρπόδεσης πρέπει να είναι προστατευμένα.- Να γίνεται καλή διαβροχή στο φύλλωμα και στα σταφύλια ψεκάζοντας με χαμηλή ταχύτητα κι από τις δυο πλευρές κάθε γραμμής.
ΩΙΔΙΟ:	<ul style="list-style-type: none">- Τα ευαίσθητα στάδια άνθησης - καρπόδεσης πρέπει να είναι καλυμμένα. Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με τον περονόσπορο. <u>Στην άνθηση να προτιμηθεί το θειάφι σε σκόνη.</u>
ΕΥΔΕΜΙΔΑ:	<ul style="list-style-type: none">- Η πτήση της ανθόβιας γενιάς του εντόμου ολοκληρώνεται στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη στις όψιμες περιοχές. Προς το παρόν δεν συντρέχουν λόγοι καταπολέμησης.
ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:	<ul style="list-style-type: none">- Δεν παρατηρείται μετακίνηση του στη βλάστηση και δεν συνιστάται ακόμη καταπολέμηση.

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ:	<ul style="list-style-type: none"> – Στο δίκτυο παγίδευσης ξεκίνησε η πτήση των αρσενικών. Από τις δειγματοληψίες παρατηρούνται νεαρές νύμφες στην τρυφερή βλάστηση που βρίσκεται κοντά στο ρυτίδωμα. Κάτω από το ρυτίδωμα, στους κορμούς και στους βραχίονες παρατηρούνται όλα τα στάδια: ενήλικα, νύμφες, ωοσωροί με αυγά και έρπουσες. – Η αντιμετώπιση του πλανόκοκκου την περίοδο αυτή είναι καθοριστική για την εξέλιξη των πληθυσμών του εντόμου, που θα “μεταναστεύσουν” στα σταφύλια κατά το κλείσιμο των τοαμπιών. – Σοβαρότερα προβλήματα αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο τα επιτραπέζια σταφύλια, όπου η ανοχή προσβολών κατά τη συγκομιδή είναι μικρή.
Διαπιστώσεις:	
Οδηγίες:	<p>Στα <u>επιτραπέζια αμπέλια</u> με ιστορικό προσβολών συνιστάται επιμελημένος ψεκασμός σε <u>κορμούς και βραχίονες</u> το διάστημα:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Πρώιμες, ενδιάμεσες περιοχές: 26-28 Μαΐου. – Μεσοπρώιμες περιοχές: 29-31 Μαΐου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω εχθρών και ασθενειών να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας έχουμε αποστείλει.

Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

📄 Το δελτίο εμφανίζεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: www.minagric.gr.

Ηράκλειο 24 Μαΐου 2011
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τρουλλάκης Γιάννης