

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616 Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minagric.gr
και αποστέλλονται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω e-mail με αίτημα στο
agrodeltiokriti@gmail.com

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.





ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο Ν°16

- Ευδεμίδα:** Έναρξη 3ης πτήσης στην μεσοπρώιμη ζώνη σε Ηράκλειο - Λασιθί.
- Ωίδιο:** Ευνοϊκές συνθήκες. Συνδυασμένες επεμβάσεις με ευδεμίδα.
- Βοτρώτης:** Εμφάνιση λόγω καιρικών συνθηκών και ευπαθών φαινολογικών σταδίων (γυάλισμα).

Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας στη φυτοπροστασία.

Η αποτελεσματικότητα των χημικών επεμβάσεων εξαρτάται άμεσα από τις καλλιεργητικές πρακτικές. Η ζώνη των σταφυλιών να διατηρείται ελεύθερη ώστε να υπάρχει επαρκής αερισμός και να φτάνει το φάρμακο στα σταφύλια. Σταφύλια κρυμμένα όπως και τα συμπαγή (σφιχτά) κατά κανόνα προσβάλλονται από κάποιο έντομο (ευδεμίδα, ψευδόκοκκο) ή κάποιο μύκητα (βοτρώτη, όξινη σήψη) που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα.

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπέλου στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας	Κλίμακα Baggjolini				
		Στάδιο Κ ανάπτυξη ρωγών	Στάδιο Λ κλείσιμο σταφυλιών	Στάδιο Μ αρχή γυαλισματος γυάλισμα	
				γυάλισμα	
			Τα σταφύλια γυαλίζουν		
Πρώιμη ζώνη			τα σταφύλια κλείνουν		
Μεσοπρώιμη					
Όψιμη ζώνη					


Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

Παρατηρήσεις υπαίθρου : Ρ.Οικονομάκη, Σ.Λούρου, Ν.Μπαγκής,
Δ.Α.Ο.Κ. Χανίων, Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης.

Αμπέλι Δελτίο Ν° 16 - 29/6/2018

Σελίδα 1 από 2

ΕΥΔΕΜΙΔΑ :
(*Lobesia botrana*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Στους ν. Ηρακλείου - Λασιθίου, η 3^η γενιά έχει ξεκινήσει στην μεσοπρώιμη ζώνη και παρατηρούνται οι πρώτες αραιές ωτοκίες.

Οδηγίες :

Ενδεικτικές ημερομηνίες αντιμετώπισης στους ν. Ηρακλείου - Λασιθίου:

Μεσοπρώιμη ζώνη	• Επιτραπέζια : 3 – 5 Ιουλίου
	• Σουλτανίνα – οινάμπελα : 6 – 8 Ιουλίου

Προσοχή. Προσβολές από την 3^η γενιά συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

Σημείωση. Για την εξέλιξη της ευδεμίδας στις υπόλοιπες περιοχές θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΩΙΔΙΟ :

(*Erysiphe necator*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα, οι μίσχοι - άξονες των σταφυλιών μέχρι τη συγκομιδή ενώ το φύλλωμα όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Οδηγίες :

- Να γίνονται συνδυασμένες επεμβάσεις με την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

ΒΟΤΡΥΤΗΣ :

(*Botrytis cinerea*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Ευνοϊκές για τον βοτρυτή συνθήκες κατά θέσεις λόγω:

1. αυξημένης υγρασίας και διυγράνσεων φύλλων μεγάλης διάρκειας ως αποτέλεσμα των διαδοχικών βροχοπτώσεων που προηγήθηκαν
2. ευαίσθητο στάδιο του γυαλίσματος που επικρατεί σε πολλά αμπέλια.

Οδηγίες :

- Λόγω της παρατεταμένης αυξημένης σχετικής υγρασίας που καταγράφεται σε ορισμένες θέσεις, συνιστώνται τα εξής :

1. Αποφύλλωση στη ζώνη των σταφυλιών. Είναι βασική προϋπόθεση στην καταπολέμηση του βοτρυτή. Εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη κυκλοφορία του αέρα μέσα και γύρω από τα σταφύλια με αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση της υγρασίας. Για τους περισσότερους μύκητες που προσβάλλουν τα εναέρια φυτικά όργανα η υψηλή υγρασία είναι ο κύριος παράγοντας για την πραγματοποίηση της μόλυνσης και την περαιτέρω εξάπλωσή τους.
2. Σε σταφύλια που έχουν εμφανιστεί συμπτώματα να γίνει καταπολέμηση.

Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2018

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για το αμπέλι εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες πρωιμότητας: **πρώιμη** (παραλιακή), **μεσοπρώιμη** (ενδοχώρα) και **όψιμη** (ορεινή). Αν και περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια την γενική τάση που επικρατεί ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων, στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, στηριζόμενοι στις συστάσεις των Δελτίων και σε συνεργασία με τον τοπικό γεωργικό σας σύμβουλο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του αμπελώνα (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά).

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

Παρατηρήσεις υπαίθρου : Ρ.Οικονομάκη, Σ.Λούρου, Ν.Μπαγκής,

Δ.Α.Ο.Κ. Χανίων, Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης.

Αμπέλι Δελτίο Ν° 16 - 29/6/2018

Σελίδα 2 από 2