

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.224948, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

2.

Παρατηρήσεις υπαίθρου: Σ. Λούρου, Μ. Ροδιτάκη



Διαλευρώδης: Προσβεβλημένα νεαρά φύλλα. Αυγά και νεαρά
προνυμφικά στάδια (1^ο και 2^ο) στην κάτω επιφάνεια των φύλλων.

Αλευρώδεις: Καπνιά πάνω σε
μελιτώματα.



Φυλλοκνίστης: Χαρακτηριστικές οφιοειδείς στοές και συστροφή των φύλλων. Διακρίνεται η προνύμφη
μέσα στη στοά και η νύμφη εξωτερικά.

<p>ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: (<i>Ceratitis capitata</i>)</p> <p>Αντιμετώπιση:</p>	<p>Να συνεχιστεί η προστασία στις <u>όψιμες ποικιλίες</u> (όψιμα πορτοκάλια, μανταρίνια και γκρέιπ φρουτ).</p> <p>Οι προσβεβλημένοι καρποί εσπεριδοειδών και άλλων οπωροφόρων δέντρων που συνυπάρχουν στον αγρό και προσβάλλονται από τη μύγα να απομακρύνονται και να καταστρέφονται.</p>
<p>ΔΙΑΛΕΥΡΩΔΗΣ (<i>Dialeurodes citri</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p> <p>Συστάσεις:</p>	<p>Ολοκληρώνονται οι εκκολάψεις και παρατηρούνται τα νεαρά προνυμφικά στάδια που είναι ευαίσθητα στην καταπολέμηση.</p> <p>– Στα δέντρα όπου διαπιστώνεται προσβολή στη νέα βλάστηση ή είχαν προσβληθεί από διαλευρώδη την προηγούμενη χρονιά συστήνεται επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα στο διάστημα: 18 - 21 Ιουνίου.</p> <p><u>Επιλέγεται σκευάσματα χαμηλής τοξικότητας με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα</u> (παρασιτοειδή, αρπακτικά). <u>Αποφεύγετε γενικευμένους ψεκασμούς με χρήση φυτοπροστατευτικών ευρέως φάσματος.</u></p> <p><u>Τα παραφινικά λάδια</u> χρησιμοποιούνται σε δέντρα ποτισμένα και σε καλή θρεπτική κατάσταση όταν δεν προβλέπεται οι θερμοκρασίες να ξεπεράσουν τους 30°C τουλάχιστον για ένα διήμερο μετά τον ψεκασμό.</p>
<p>ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ: (<i>Phyllocnistis citrella</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Παρατηρούνται αραιές οι πρώτες προσβολές στην τρυφερή βλάστηση. Προσβάλλει νεαρά φύλλα σχηματίζοντας χαρακτηριστικές <u>οφιοειδείς στοές</u> στην κάτω επιφάνεια. Τα προσβεβλημένα φύλλα αναδιπλώνονται, αποκτούν αργυρόχρωμη όψη και ξηραίνονται.</p> <p>– Ο φυλλοκνίστης αναπτύσσει πυκνούς πληθυσμούς το καλοκαίρι και το φθινόπωρο σε λαίμαργους βλαστούς και σε νεαρό φύλλωμα. Προσεκτικοί καλλιεργητικοί χειρισμοί περιορίζουν ένα έντονο δεύτερο κύμα βλάστησης, όπως <u>ισορροπημένες αρδεύσεις, περιορισμός όψιμων αζωτούχων καλοκαιρινών λιπάνσεων, αφαίρεση και απομάκρυνση τρυφερών λαίμαργων βλαστών σε συνδυασμό με κατάλληλο κλάδεμα.</u></p> <p>– <u>Άμεση έναρξη προστασίας των νεαρών δέντρων σε φυτώρια και σε νέες φυτεύσεις.</u> Συστήνεται εβδομαδιαία εξέταση της τρυφερής βλάστησης για νέες προσβολές και ανάλογα επαναλήψεις της επέμβασης στη διάρκεια του καλοκαιριού λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο δράσης των σκευασμάτων.</p> <p>– Στα δέντρα <u>παραγωγικής ηλικίας όριο ανεκτής προσβολής θεωρείται ποσοστό μέχρι 20% της φυλλικής επιφάνειας.</u> Τα <u>καλλιεργητικά μέτρα</u> αποτρέπουν σοβαρές προσβολές.</p>

Δεδομένα για την Π.Ε. Χανίων λαμβάνονται με την συνεργασία της ΔΑΟΚ Χανίων.

- Χρησιμοποιείτε σκευάσματα φυτοπροστασίας με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών. Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ <https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul> και στις επιλογές: **ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΕΝΤΟΜΟ** (Εχθρό) ή **ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΘΕΝΕΙΑ** ανά καλλιέργεια (πορτοκαλιά, μανταρίνια, λεμονιά, κ.ά.) μπορείτε να ενημερώνεστε για τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των εγκρίσεων.
- Εφαρμόζετε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα συσκευασίας κάθε σκευάσματος. Τηρείτε αυστηρά το χρόνο που αναγράφεται μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.
- Για την προστασία των ωφέλιμων εντόμων (αρπακτικά, παρασιτοειδή) προτιμάτε τα φυτοπροστατευτικά με ήπια και περιορισμένη δράση.

Ηράκλειο 16 Ιουνίου 2022
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη