

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Οδός Σταύρου Νιάρχου (τέρμα)
Τ.Θ. 02 Τ.Κ. 45003 Ανατολή Ιωάννινα
Πληροφορίες: Κ. Βάντζιος.
Τηλέφωνο : 26510 40707 , 26510 44055
FAX : 26510 41902

ΑΜΠΕΛΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Βάντζιος.

3. 2 / 5 /2011

Βλαστικό στάδιο : Ζίτσα Ιωαννίνων (Ντεμπίνα) έκπτυξη. Σακελαρικό έξοδος 7^{ου} φύλλου.
Λευκάδα από έξοδος 5^{ου} φύλλου έως διαχωρισμός σταφυλιού (Merlot).
Κέρκυρα (Κακοτρύγης) έξοδος 5^{ου} φύλλου.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Η στρατηγική ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του περονόσπορου, συνίσταται στην συχνή επιθεώρηση των αμπελώνων προκειμένου να διαπιστωθούν έγκαιρα οι πρώτες εστίες μόλυνσης και στην συνέχεια να ξεκινήσουν οι ψεκασμοί. Το δυναμικό πολλαπλασιασμού των δευτερογενών μολύνσεων είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των πρωτογενών. **Επωφεληθείτε από τις εργασίες αραίωσης βλαστών για να επιθεωρήσετε τους αμπελώνες.**

Στην Λευκάδα και την Κέρκυρα και τους πιο πρώιμους αμπελώνες της Ζίτσας (Σακελαρικό) μετά από τις βροχοπτώσεις στα τέλη του μήνα (27/4 & 28/4) πρέπει να περιμένουμε την εμφάνιση των πρώτων κηλίδων περονόσπορου από 3/5 (Λευκάδα) έως 10/5 (Κέρκυρα, Σακελαρικό Ιωαννίνων).

Οι ψεκασμοί πρέπει να ξεκινήσουν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου σε όλες τις περιοχές που αναφέραμε παραπάνω και να προτιμηθεί κάποιο δεισδυτικό φάρμακο αν έχει διαπιστωθεί κηλίδα κατά την επιθεώρηση του αμπελώνα. Οι ψεκασμοί να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τις βροχοπτώσεις και την διάρκεια δράσης των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων. **Στην υπόλοιπη περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων δεν φαίνεται να επικράτησαν μέχρι τώρα συνθήκες κατάλληλες για την εκδήλωση της ασθένειας.**

Κατάλληλα φάρμακα:

Α) Επαφής : χαλκούχα, φολπέτ, μανκοζέμπ, μανέμπ, προπινέμπ, ντιθιανόν, κ.α. (διάφορα σκευάσματα). Προστατεύουν μόνο τα φυτικά όργανα που έχουν καλύψει για 6-8 μέρες την περίοδο της γρήγορης ανάπτυξης του φυτού και ξεπλένονται από την βροχή (20-25 mm). Ο περονόσπορος δεν παρουσιάζει ανθεκτικότητα σε αυτές τις ουσίες.

Ο χαλκός αυτήν την εποχή μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση βλάστησης και φυτοτοξικότητα σε ορισμένες ποικιλίες. Καλό είναι να χρησιμοποιηθεί αργότερα.

Λόγω της έντονης βλαστικής δραστηριότητας και των συχνών βροχοπτώσεων προτιμήστε αυτήν την εποχή δεισδυτικά φάρμακα.

Β) Δεισδυτικά : Δρουν προληπτικά και θεραπευτικά, δεν ξεπλένονται από την βροχή.

1) Συμοξανίλ, (Δράση 6-12 μέρες ανάλογα με την πίεση προσβολής). 2) Ντιμεθομόρφ, μαντιπροπαμίντ, μπεντιαβαλικάρμπ, ιπροβαλικάρμπ, φλουοπικολίντ (Δράση από 10-14 μέρες).

3) Ζοξαμίντ (Δράση 10-12 μέρες). 4) Αζοξιστρομπίν, πυρακλοστρομπίν, φαμοξαντόν (διαρκούν όσο η ουσία που συμμετέχει μαζί τους στο σκεύασμα) κ.α. (διάφορα σκευάσματα).

Γ) Διασυστηματικά : 1) Φοσετύλ-αλ (Δράση από 10-14 μέρες). 2) Μεταλαξύλ, μεταλαξύλ-M, μπεναλαξύλ, μπεναλαξύλ-M (διάφορα σκευάσματα) (Δράση 10-14 μέρες). Δρουν προληπτικά και θεραπευτικά, δεν ξεπλένονται από την βροχή γιατί εισχωρούν και μετακινούνται μέσα στο φυτό.

Οι δραστικές των ομάδων Β και Γ (εκτός από το Φοσετύλ-αλ) εγκυμονούν κινδύνους ανάπτυξης ανθεκτικότητας του μύκητα γι' αυτό και κυκλοφορούν σε μίγματα με τα επαφής και πρέπει να χρησιμοποιούνται έως 3 φορές το χρόνο (1-2 για την ομάδα Γ) και σε εναλλαγές τόσο με τα επαφής όσο και μεταξύ των κατηγοριών ως προς τον τρόπο δράσης..

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Επιτρέπεται μόνο η χρήση αμιγώς χαλκούχων σκευασμάτων, και εγκεκριμένων για την βιοκαλλιέργεια σκευασμάτων που προάγουν την άμυνα του φυτού.

ΦΟΜΟΨΗ ΩΙΔΙΟ ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Οι χαμηλές θερμοκρασίες του τελευταίων εβδομάδων έχουν καθλώσει την βλάστηση αυξάνοντας τον κίνδυνο προσβολής από την φόμοψη. Στην περιοχή της Ζίτσας (όψιμοι αμπελώνες) οι περισσότεροι αμπελώνες βρίσκονται στο κατάλληλο στάδιο για ψεκασμό. Όπου είναι εφικτό να ακολουθηθεί η στρατηγική των 2 ψεκασμών βλ ΔΓΠ 2,1/4/2011. Κανένας ψεκασμός δεν είναι επιβεβλημένος μέχρι τώρα για το ωίδιο και την ευδεμίδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα (βλ λίστα ΔΓΠ 2,1/4/2011), να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα της συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν, μην κάνετε υπέρβαση των δόσεων και να ελέγχετε την συνδυαστικότητα των γεωργικών φαρμάκων.



Η Προϊσταμένη
Του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Ιωαννίνων α.α.

Ιωάννα Γ. Χουλιάρα
Γεωπόνος