

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Οδός Πανεπιστημίου (τέρμα)
Τ.Κ. 451 10 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Κ. Βάντζιος.
Τηλέφωνο : 26510 40707 , 26510 44055
FAX : 26510 41902

ΑΜΠΕΛΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Βάντζιος.

6. 21 / 6 /2011

Βλαστικό στάδιο: Από δέσιμο έως πριν το «κλείσιμο» του τσαμπιού.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Στην περιοχή της Ζίτσας έχουν σημειωθεί πολύ σοβαρές προσβολές, να συνεχιστεί η προστασία όσο επαναλαμβάνονται βροχοπτώσεις. Για τα διεισδυτικά σκευάσματα θεωρείστε ότι διαρκούν 12-14 μέρες αυτή τη εποχή. Τώρα που οι βροχές έχουν αραιώσει μπορούν να χρησιμοποιούνται και χαλκούχα σκευάσματα.

ΩΙΔΙΟ

Να συνεχιστεί η προστασία σε όλες τις περιοχές. Η πίεση προσβολής είναι μεγάλη ειδικά στην Κέρκυρα και την Λευκάδα και οι ψεκασμοί πρέπει να ανανεώνονται αμέσως με το πέρας της διάρκειας δράσης του σκευάσματος. Να γίνονται εναλλαγές ανάμεσα στις κατηγορίες των σκευασμάτων βλ. ΔΓΠ 4, 12-5-2011

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Στο στάδιο πριν το «κλείσιμο» του τσαμπιού να γίνει ψεκασμός με ειδικό βοτρυδιοκτόνο σε όλες τις ευαίσθητες ποικιλίες (π.χ. Ντεμπίνα κ. α.) που μπορεί να αφορά μόνο την ζώνη των σταφυλιών,.

Κατάλληλα φάρμακα:· Φλουζινάμ, Θειράμ, Φλουντιοξονίλ & Συπροντινίλ, Μεπανιπυρίμ, Μποσκαλίντ, Φενεξαμίντ, , κ.α. (Διάφορα σκευάσματα.)

ΕΥΔΕΜΙΑ

Η πτήση της δεύτερης γενιάς ξεκίνησε. Ο αριθμός των συλλήψεων στο δίκτυο παγίδων είναι χαμηλός.

Να γίνει ψεκασμός στους αμπελώνες της Κέρκυρας, της Λευκάδας και στους πρώιμους αμπελώνες της περιοχής της Ζίτσας (Σακελαρικό) μόνο αν παρατηρήθηκαν συμπτώματα (φωλιές διατροφής) πάνω από 5-10 % στα τσαμπιά κατά την προηγούμενη γενιά. **Προσοχή στους περισσότερους αμπελώνες της Ζίτσας δεν χρειάζεται ψεκασμός.**

Οι ψεκασμοί στους αμπελώνες με ζημιές να γίνουν στις ακόλουθες ημερομηνίες ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα.

Άμεσα : φενοξικάρμπ, χλωραντρανιλιπρόλ και επανάληψη σε 14 μέρες

26/6: φλουφenoξουρόν, τεμπουφenoζαίντ, λουφenoουρόν, μεθοξυφenoζαίτ

26-27/6: Βάκιλλο Θουριγγίας με προσθήκη 1% ζάχαρης και επανάληψη του ψεκασμού σε 12 μέρες (βιοκαλλιεργητές)

26-27/6: μίγμα Βάκιλλου Θουριγγίας με φενοξυκάρμπ

26-28/6: σπινοσάντ και άλλα νευροτοξικά προνυμφοκτόνα.

Αν δεν υπάρχει άλλο εντομολογικό πρόβλημα προτιμήστε κάποια από τις προαναφερόμενες δραστικές ουσίες που είναι λιγότερο τοξικές για τα ωφέλιμα αρθρόποδα και στοχεύστε τον ψεκασμό μόνο στην περιοχή των σταφυλιών. Αν υπάρχει προσβολή από άλλο έντομο συμβουλευτείτε την λίστα εντομοκτόνων που σας έχει αποσταλεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα, να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σ' αυτήν.



Η Προϊσταμένη
Του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Ιωαννίνων α.α.

Ιωάννα Γ. Χουλιάρα
Γεωπόνος

Το δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Παρέχει μια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι αμπελουργοί καλούνται συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία