

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Οδός Πανεπιστημίου (τέρμα)
Τ.Θ.02 Τ.Κ. 45003 Ανατολή Ιωάννινα
Τηλέφωνο : 26510 40707 , 26510 44055
FAX : 26510 41902

ΑΜΠΕΛΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Βάντζιος.

3. 24/ 4 /2012

Βλαστικό στάδιο : **Λευκάδα, Κέρκυρα: Ορατές ταξιανθίες**

Ζίτσα: Έκπτυξη (Σακελλαρικό: 1-3 Φύλλα)

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Στην Λευκάδα και την Κέρκυρα αναμένονται να εμφανιστούν οι πρώτες κηλίδες από τις 23/4/2012 μετά τις βροχές που προηγήθηκαν μια εβδομάδα νωρίτερα. Επωφεληθείτε από τις εργασίες αραίωσης βλαστών για να επιθεωρήσετε τους αμπελώνες ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα τυχόν κηλίδες περονοσπόρου στα φύλλα. **Οι ψεκασμοί πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα σε Κέρκυρα και Λευκάδα και να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τις βροχοπτώσεις και την διάρκεια δράσης των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων.**

Στην περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων δεν φαίνεται να επικράτησαν μέχρι τώρα συνθήκες κατάλληλες για την εκδήλωση της ασθένειας, καθώς στις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν οι αμπελώνες δεν βρίσκονταν σε στάδιο επιδεκτικό μολύνσεων (θα ακολουθήσει επόμενο δελτίο).

Κατάλληλα φάρμακα: βλ. λίστα που σας έχει σταλεί με το ΔΓΠ2, 26/3/2012
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ

Για την Διάρκεια Δράσης των Σκευασμάτων σημειώσατε ότι τα Σκευάσματα Επαφής προστατεύουν μόνο τα φυτικά όργανα που έχουν καλύψει και ξεπλένονται από την βροχή (20-25 mm). Λόγω της έντονης βλαστικής δραστηριότητας και των συχνών βροχοπτώσεων, προτιμήστε αυτήν την εποχή σκευάσματα που περιέχουν Διεισδυτικές ή Διασυστηματικές Δραστικές Ουσίες, που η δράση τους υπολογίζεται από 6-14 ημέρες, ανάλογα με το σκεύασμα και δεν ξεπλένονται από την βροχή.

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Επιτρέπετε μόνο η χρήση αμιγώς χαλκούχων σκευασμάτων, και εγκεκριμένων για την βιοκαλλιέργεια σκευασμάτων που προάγουν την άμυνα του φυτού.

ΩΙΔΙΟ (Κέρκυρα Λευκάδα)

Οι ψεκασμοί ή τα σκονίσματα να ξεκινήσουν όταν το μήκος βλάστησης φτάσει τα 25 εκατοστά (διαχωρισμός τσαμπιού).

ΦΟΜΟΨΗ (Ζίτσα)

Οι χαμηλές θερμοκρασίες του τελευταίων εβδομάδων έχουν παρατείνει το στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών αυξάνοντας τον κίνδυνο προσβολής από την φόμοψη στους

αμπελώνες της περιοχής της Ζίτσας. Να ακολουθηθεί η στρατηγική των 2 ψεκασμών βλ ΔΓΠ 2,26/3/2012.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα (βλ λίστα ΔΓΠ 2.26/3/2012) να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα της συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν, μην κάνετε υπέρβαση των δόσεων και να ελέγχετε την συνδυαστικότητα των γεωργικών φαρμάκων. Να γίνονται εναλλαγές στην χρήση των ομάδων και των κατηγοριών των σκευασμάτων ως προς τον τρόπο δράσης για να προληφθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των ασθενειών στα φάρμακα..



Η Προϊσταμένη
Του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Ιωαννίνων α.α.

Ιωάννα Γ. Χουλιάρα
Γεωπόνος

Το δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα.

Παρέχει μια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι αμπελουργοί καλούνται συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία.

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).