

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Οδός: Πανεπιστημίου (τέρμα) Τ.Κ.: 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 44055 – 26510 40707 Fax: 2651 41902
Email: pkpf@otenet.gr



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ν. Μέτσιος- Κ. Βάντζιος.

4. 18/7/2017




<http://www.forestryimages.org/>



<http://dimetris.com.ua/>



<http://gipcitricos.ivia.es/>



<http://animalandia.educa.madrid.org/>

ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ

ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ

Ο περιορισμός των προσβολών από τα κοκκοειδή (ψώρες) πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε καλλιεργητικά μέτρα και λιγότερο σε εφαρμογές φυτοπροστατευτικών. Το κατάλληλο κλάδεμα για τον καλύτερο αερισμό της κόμης μειώνει δραστικά τους πληθυσμούς των εχθρών.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ

Η πτήση των αρσενικών της 2^{ης} γενιάς βρίσκεται στην κορύφωσή της. Η καταπολέμηση της 2^{ης} γενιάς της κόκκινης ψώρας είναι στρατηγικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εχθρού, καθώς οι επόμενες γενιές είναι αλληλοεπικαλυπτόμενες και συνεπώς είναι δύσκολο να στοχευθούν.

Μόνο σε εκείνους τους σπρωγώνες που παρατηρήθηκαν κατά την συγκομιδή, την περσινή περίοδο, πάνω από 4-10 άτομα της κόκκινης ψώρας ανά καρπό, με το μικρότερο όριο για τα μα- νταρίνια και το μεγαλύτερο για τα πορτοκάλια, και αν η προσβολή ήταν ομοιόμορφη (δηλαδή αφορούσε τα περισσότερα δέντρα), **να γίνει επέμβαση με ένα από τα κατάλληλα φάρμακα**, [βλέπε λίστα που έχει αποσταλεί].

Σε όσους σπρωγώνες έχουν έντονη προσβολή και έγινε καταπολέμηση της πρώτης γενιάς με νευροτοξικά σκευάσματα (ΔΓΠ 2.16/5/2017) καλό είναι να γίνει επανάληψη της επέμβασης αυτή την εποχή.

Ακολουθούν προτεινόμενες ημερομηνίες εφαρμογών ανάλογα με την περιοχή και το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα:

Περιοχή	Άρτας -Πρέβεζας	Θεσπρωτίας Ασπροκλήσι, Κεστρίνη, Σαγιά- δα, Γλυκή (Παραμυθιάς)
Παραφινικά λάδια, άλατα καλίου λιπαρών οξέων, οργανοφωσφορι- κά, πυρεθρίνες.	Από την λήψη του Δελτίου έως τις 24/7	20/7-26/7
Pyriproxifen.	26/7-31/7	28/7-02/8
Spirotetramat.	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την λήψη του δελτίου έως το τέλος Ιουλίου καθώς θανατώνει όλα τα στάδια των προνυμφών.	

ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ

Σε οπωρώνες της **Θεσπρωτίας** που παρουσιάζουν έντονες προσβολές να γίνει επέμβαση από τέλος Ιουλίου μέχρι 6 (έξι) Αυγούστου.

Κατάλληλα φάρμακα: Βλέπε λίστα που έχει αποσταλεί

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. Ιωαννίνων κ.α.
Δρ. Χρήστος Ρούκος
Γεωπόνος

Το δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Παρέχει μια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί καλούνται συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο:

<http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/134-ioannina>