



Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς
 Τ. Κ. : 65404 Τ.Θ.: 1235
 Τηλ. : 2510 600439, 2510 600451
 E mail : thgeorgiadou@minagric.gr

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και ΔΑΟΚ Σερρών

No 06/13-03-2025

Πληροφορίες : Θεοδώρα Α. Γεωργιάδου, Δρ Δήμητρα Στουγιαννίδου.



Εικόνα 1 Βλαστικά Στάδια Αμυγδαλιάς (πηγή : <https://www.horticulture.com.au>)

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 2^ο ΔΕΛΤΙΟ

Η αμυγδαλιά βρίσκεται στα στάδια της λευκής κορυφής έως έναρξη της άνθησης ανάλογα με την ποικιλία και την περιοχή. Σε κάθε περίπτωση κατά τα στάδια αυτά και μέχρι την ολοκλήρωση της καρπόδεσης, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν προληπτικοί ψεκασμοί εναντίον της μονιλίας.

ΜΟΝΙΛΙΑ (*Monilinia* spp)

Η Μονιλία (Φαιά Σήψη) θεωρείται η πιο σημαντική μυκητολογική ασθένεια και απαιτεί συστηματική καταπολέμηση. Η προσβολή εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα κατά τα βλαστικά στάδια της λευκής ή ροζ κορυφής, στην πλήρη άνθηση και μετά την ολοκλήρωση της πτώσης των πετάλων, είναι οικονομικά επιζήμια. Η ασθένεια ενδημεί σε όλους τους νομούς της περιοχής ευθύνης της υπηρεσίας μας και ευνοείται από συνθήκες υψηλής υγρασίας λόγω βροχοπτώσεων και χαμηλών σχετικά θερμοκρασιών.



Εικόνα 1 Συμπτώματα μονιλίας σε βλαστούς και καρπό αμυγδαλιάς

Τα συμπτώματα της προσβολής (νεκρώσεις-ξηράνσεις ανθέων, κλαδίσκων, έκκριση κόμμεος στους κλαδίσκους) ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες, μπορεί να εκδηλωθούν και σε μεταγενέστερο στάδιο (καρπίδιο) όπου η αντιμετώπισή της είναι δύσκολη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλή αποτελεσματικότητα των ψεκασμών.

Συνεπώς πρέπει να λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα προληπτικά μέτρα (ψεκασμοί σε ευνοϊκές συνθήκες για τις μολύνσεις). Ο αριθμός των επαναλήψεων κατά την διάρκεια των ψεκασμών εξαρτάται από το φυτοπροστατευτικό προϊόν και τις μετεωρολογικές συνθήκες (όταν αναμένονται βροχοπτώσεις) που επικρατούν σε κάθε περιοχή.

Η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ. και να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης στη δοσολογία, συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή. Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευτούν για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθόγνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ. <https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul>

✚ Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, thgeorgiadou@minagric.gr, dimstou@minagric.gr

✚ το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr



✚ Το παρόν δελτίο παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής i-agric του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου