Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς
Τ. Κ. : 65404 Τ.Θ.: 1235
Τηλ. : 2510 600439

E mail : thgeorgiadou@minagric.gr

Πληροφορίες : **Θεοδώρα Α. Γεωργιάδου**

Το παρόν δελτίο εκδίδεται ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών

No 26/08-07-2026

1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
Diabrotica virgifera

Στόχοι

Απευθύνεται στους καλλιεργητές αραβοσίτου με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εντόμου Διαβρώτικα.

Πληροφορίες για το έντομο

Εικόνα 1 Π.Κ.Π.Φ.Π.Φ.Ε Καβάλας

Το έντομο έχει μία γενεά ανά έτος και προσβάλει κυρίως τον αραβόσιτο. Η ζημιά που προκαλεί στο ριζικό σύστημα η νεαρή προνύμφη (εκκόλαψη των αυγών τον Μάιο μήνα), έχει ως αποτέλεσμα τη μη επαρκή θρέψη των φυτών. Η δραστηριότητα των προνυμφών περιορίζεται στο έδαφος ενώ τα ενήλικα πετούν σε μεγάλες αποστάσεις προς ανεύρεση τροφής. Η προσβολή προκαλεί κακή στήριξη και ελλιπή θρέψη με αποτέλεσμα το πλάγιασμα των φυτών και συνέπεια τη μείωση της παραγωγής.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στις περιοχές όπου ο αραβόσιτος καλλιεργείται εντατικά ως μονοκαλλιέργεια (δεν εφαρμόζεται αμειψισπορά τουλάχιστον ενός έτους).

Η χρήση εντομοκτόνων εδάφους έχει ορισμένη χρονική εφαρμογή και στοχεύει στις νεαρές προνύμφες που εκκολάπτονται στο έδαφος.

Διαπιστώσεις

Εικόνα 2 Π.Κ.Π.Φ.Π.Φ.Ε Καβάλας

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με το υπ.αριθμ.: **157885/17-06-2026** έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Προστασίας Φυτών) του Υπ.Α.Α.Τ.

Η παρακολούθηση για την πτήση του εντόμου ξεκίνησε τέλη Μαϊου με παγίδες που εγκαταστάθηκαν από τις Δ.Α.Ο.Κ των Περιφερειακών Ενοτήτων Α.Μ.Θ και την Δ.Α.Ο.Κ Σερρών(Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας). Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις διαπιστώθηκε ότι η έναρξη της πτήσης του εντόμου ξεκίνησε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο στάδιο όπου έχει ολοκληρωθεί η γονιμοποίηση στις περισσότερες περιοχές και έχει ξεκινήσει το γέμισμα του καρπού (πρώιμη σπορά). Συνεπώς η τροφική δραστηριότητα που εμφανίζουν τα ενήλικα στους σπάδικες δεν αποτελεί κίνδυνο για την καρπόδεση. Παραμένει ενεργή η παρακολούθηση και η καταμέτρηση του πληθυσμού του εντόμου με βάση τον αριθμό συλλήψεων ανά παγίδα, μέχρι και τη συγκομιδή.

Η τελική αξιολόγηση της πορείας των πληθυσμών θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της συγκομιδής όπου και θα δοθούν οδηγίες κατάλληλες για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Συστάσεις

Καλλιεργητικά Μέτρα

Ουσιώδες καλλιεργητικό μέτρο για την ομαλή εξέλιξη της καλλιέργειας αυτή την περίοδο είναι η επάρκεια αρδευτικού νερού για την ευρωστία των φυτών. Δεν συνιστώνται ψεκασμοί (ψεκασμοί φυλλώματος) για την καταπολέμηση του εντόμου λόγω του αναπαραγωγικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται το φυτό. Επίσης δεν συνιστάται συνδυαστική χρήση με σκευάσματα που αφορούν άλλες ασθένειες του φυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες για την καταπολέμηση του εντόμου στο ενημερωτικό φυλλάδιο της ΔΑΟΚ Δράμας το οποίο είναι διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο στο διαδίκτυο: https://planthealthdrama.wordpress.com/2020/02/19/διαβρώτικα-οδηγίες-αντιμετώπισης-2020/ .

- Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις , **thgeorgiadou@minagric.gr, miliadou@minagric.gr**
- Το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής i-agric του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου