

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

7/21-02-11

1. ΑΧΛΑΔΙΑ

Βλαστικά στάδια

Γ

Γ3

Δ

Δ3

Ε

1.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Ο μύκητας προσβάλλει φύλλα, άνθη και καρπούς, όπου σχηματίζονται χαρακτηριστικές σκοτεινόχρωμες ελαιοκαστανές κηλίδες. Οι μολύνσεις της νέας βλάστησης αρχίζουν με την εμφάνισή της **(βλαστικό στάδιο Γ3-Δ /πράσινη κορυφή)** και προέρχονται από ασκοσπόρια που αναπτύσσονται το χειμώνα στα πεσμένα στο έδαφος προσβεβλημένα φύλλα. **Για να βλαστήσουν τα ασκοσπόρια πάνω στις ευπαθείς πράσινες επιφάνειες και να γίνει μόλυνση, θα πρέπει οπωσδήποτε οι επιφάνειες αυτές να είναι βρεγμένες.**

Διαπιστώσεις: Στις πεδινές περιοχές η ποικιλία «Κρυστάλλι» βρίσκεται στο **στάδιο Β-Γ**, και στις ορεινές περιοχές η ποικιλία «Κρυστάλλι» στο **στάδιο Α-Β**.

Οδηγίες: **Ψεκασμός σε όλες τις ποικιλίες αχλαδιάς στο ευαίσθητο στάδιο Γ3 - Δ με ένα εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα.** ►

2. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

- Οδηγίες:**
- 1. Ψεκασμός στο ίδιο στάδιο (Γ3-Δ) με χαλκούχο σκεύασμα.**
 - 2. Ο συνεχής έλεγχος των δενδροκομείων για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών είναι ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ. ΤΑ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΡΟΣ ΥΓΙΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ.**

3. ΨΥΛΛΑ

- Οδηγίες:**
- Να μην γίνει καμία επέμβαση. Θα σας ενημερώσουμε σε επόμενο δελτίο.**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ