

A. ΑΧΛΑΔΙΑ

1.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Διαπιστώσεις : Σε όλες τις περιοχές οι αχλαδιές βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από φουζικλάδιο. Οι χθεσινές καιρικές συνθήκες, δημιούργησαν συνθήκες μέτριας ως σοβαρής μόλυνσης μόνο στις πρώιμες πεδινές περιοχές. Πιθανή εμφάνιση κηλίδων στις αρχές του δεύτερου δεκαήμερου του Απρίλη.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στις ορεινές περιοχές δεν επέτρεψαν την δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για μόλυνση.

Οδηγίες:

Επέμβαση στις αχλαδιές των πεδινών περιοχών χρησιμοποιώντας σκεύασμα και με θεραπευτική δράση. Στις αχλαδιές των ορεινών περιοχών η επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα αρκεί.

Φυτοпр/κά προϊόντα:

A. Προστατευτική δράση: Ζιράμ, Θιράμ, Θείον, Κάπταν, Μανέμη, Μανκοζέμη (όχι σε Κρυστάλι και Κόσσια), Ντιθιανόν(ειδικά για το φουζικλάδιο έχει και θεραπευτική δράση), Ντοντίν-έχει και θεραπευτική δράση εάν εφαρμοστεί 30-36 ώρες μετά τη μόλυνση.

B. Προστατευτική και θεραπευτική δράση:

Θειοφανεΐτ-μεθύλ, Μικλομπουτανίλ, Μπιτερτανόλ, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν+ Πυρακλοστρομπίν, Πυριμεθανίλ+Φλουκουϊνκοναζόλ,Συηροντινίλ, Τριφλοξιστρομπίν.

2.ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Διαπιστώσεις: Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για το βακτήριο.

Οδηγίες:

? ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ συνεχείς επισκέψεις στα δένδροκομεία για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν προσβολών.
Τα προσβεβλημένα μέρη να αφαιρούνται άμεσα, με αρκετό μέρος υγιούς ιστού.

**? Να αποφεύγεται η υπερβολική αζωτούχος λίπανση.
(Η ζωνρή βλάστηση είναι ευαίσθητη στις μολύνσεις).**

**? Επιμελής καταπολέμηση των διαφόρων εντόμων-
εχθρών (αφίδες, ψύλλα) για τον περιορισμό της
εξάπλωσης των μολύνσεων. Τα έντομα αυτά δεν
διευκολύνουν μόνο τις μολύνσεις με τη δημιουργία
πληγών, αλλά και μεταφέρουν το βακτήριο από τους
μολυσμένους βλαστούς στους υγιείς.**

B. ΜΗΛΙΑ

1.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΗΛΙΑΣ

Γ	Γ3	Δ	Δ3	Ε	Ε2
----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

Διαπιστώσεις:

Όλες οι ποικιλίες της μηλιάς βρίσκονται στα βλαστικό στάδιο Β ως Γ ανάλογα με την ποικιλία και την πρωιμότητα της περιοχής.

Οι μολύνσεις της νέας βλάστησης, αρχίζουν με την εμφάνισή της **(βλαστικό στάδιο Γ-Γ3 – πράσινη κορυφή)** και προέρχονται από ασκοσπόρια που αναπτύσσονται το χειμώνα στα πεσμένα στο έδαφος προσβεβλημένα φύλλα. **Για να βλαστήσουν τα ασκοσπόρια πάνω στις ευπαθείς πράσινες επιφάνειες και να γίνει μόλυνση, θα πρέπει οπωσδήποτε οι επιφάνειες αυτές να είναι βρεγμένες.**

Οδηγίες:

Ψεκασμός σε όλες τις ποικιλίες στο στάδιο της πράσινης κορυφής (Γ-Γ3).

Φυτ/κά προϊόντα:

Εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα.

>

2.ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ

Το έντομο γεννά τα αυγά του μέσα στα κλειστά άνθη και η προνύμφη τρώει τους στήμονες και τον ύπερο του άνθους. Το άνθος δεν ανοίγει, ξεραίνεται και παίρνει χρώμα καστανό.

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που την περασμένη χρονιά παρατηρήθηκαν σοβαρές προσβολές, να γίνει ψεκασμός όταν τα δένδρα φτάσουν στα βλαστικά στάδια Γ3 έως Ε2, με εγκεκριμένο εντομοκτόνο.

3. ΑΙΜΑΤΟΨΕΙΡΑ

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που παρατηρούνται προσβολές (κυρίως σε παλιές φυτείες) να γίνει ψεκασμός. Απαιτείται καλή διαβροχή της κόμης και κυρίως των βλαστών και της βάσης του κορμού.

Φυτοпр/κά προϊόντα: *Θερινά λάδια, Φοσμέτ.*

4.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που υπήρχαν πέρυσι σοβαρές προσβολές (1000 αυγά σε βλαστό καρποφόρου ξύλου ενός μέτρου), μπορεί να γίνει άμεσα επέμβαση εναντίον των χειμερινών αυγών με Κλοφεντεζίν + θερινά λάδια.

Φυτοпр/κά προϊόντα: *η
β) στα βλαστικά στάδια Ε-Ε2 με Εξιθιαζόξ, αν δεν έχει προηγηθεί η επέμβαση με Κλοφεντεζίν.
ή
γ) στην πλήρη πτώση των πετάλων με Ετοξαζόλ εφόσον δεν έχει προηγηθεί καμία επέμβαση από τις προηγούμενες.*

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1.Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Σε περιπτώσεις που εντοπίζετε ύποπτα συμπτώματα προσβολής από βακτηριακό κάψιμο, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε άμεσα.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ