



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629



- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου - Ν. Λογοθέτης

4 / 25-01-12

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Βλαστικά Στάδια Βερικοκιάς



A

Οφθαλμός σε λήθαργο




B

Φούσκωμα οφθαλμού



Γ

Ροζ κορυφή



Δ

Λευκή κορυφή

ΜΟΝΙΛΙΑ

Η ευαισθησία στις προσβολές από την ασθένεια, ξεκινάει από το στάδιο Γ (Ροζ μπουμπούκι) και συνεχίζεται σε όλη την περίοδο της ανθοφορίας, μέχρι την πτώση των πετάλων.

Βροχερός, ψυχρός και νεφοσκεπής καιρός είναι κατ' εξοχήν ευνοϊκός για την ανάπτυξη της ασθένειας και την πραγματοποίηση μολύνσεων.

Διαπιστώσεις:

Βλαστικά Στάδια:

Υπερπρώιμες ποικιλίες: στάδιο Β-Γ .

Πρώιμες ποικιλίες : στάδια Α-Β

Όψιμες ποικιλίες στα στάδια Α .

Οδηγίες :

Άμεσος ψεκασμός στις υπερπρώιμες ποικιλίες. Στις πρώιμες και όψιμες, να γίνει ψεκασμός όταν φτάσουν στο ευαίσθητο στάδιο Γ.

Τα δέντρα πρέπει να είναι προστατευμένα από την μονιλία, καθ' όλη τη διάρκεια της άνθησης .

Φυτ/κά προϊόντα :

Θιράμ, Θειοφανεΐτ –μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Ιπροντιόν, Κάπταν, Μπασκαλίντ+Πυρακλостρομπίν, Προπικοναζόλ, Προχλωράζ, Συπροντινίλ, {Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.



Β.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

1.ΜΟΝΙΛΙΑ

Οδηγίες:

Η ευαισθησία στις προσβολές από την ασθένεια ξεκινάει από το ροζ μπουμπούκι και συνεχίζεται μέχρι την πτώση των πετάλων και συνεπώς, αυτό το χρονικό διάστημα τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα. Άμεση επέμβαση στις υπερπρώιμες ποικιλίες.

Φυτ/κά προϊόντα:

1. Ροδακινία: *Ζιράμ, Θειοφανεΐτ –μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Θιράμ, Ιπροντιόν, Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Προπικοναζόλ, Προχλωράζ (μέχρι την πτώση πετάλων), Συπροντινίλ, {Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.*

2. Νεκταρινιά: *Ιπροντιόν, Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Προπικοναζόλ, {Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.*

2.ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Οδηγίες:

Η περίοδος που μεσολαβεί από την έκπτυξη του ακραίου φυλλοφόρου οφθαλμού και μέχρι τα φύλλα να αποκτήσουν το τελικό μέγεθος είναι κρίσιμη για την ασθένεια. Τα δένδρα πρέπει να είναι καλά προστατευμένα σ'αυτή την περίοδο.

Φυτ/κά προϊόντα:

Ζιράμ, Θιράμ, Κάπταν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Κατά τον πρώτο ψεκασμό για την μονιλία, να προτιμάται η χρήση χαλκούχου σκευάσματος.
- ✓ Επειδή έχουν παρατηρηθεί ανθεκτικά στελέχη σε διάφορες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καλό είναι να **εναλλάσσονται** στη σειρά των ψεκασμών, για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.
- ✓ Μετά από βροχόπτωση συνιστάται η επανάληψη του ψεκασμού.
- ✓ Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ