



# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

38 /3-9-12

## **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ**

### **1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ**

**Διαπιστώσεις:** Η έξοδος των νεαρών ερπυσών βρίσκεται σε εξέλιξη.

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση από 8 έως 12 Σεπτέμβρη σε όλες τις περιοχές.

**Φυτ/κά προϊόντα:** Θερινός πολτός, *Πυριπροξυφέν, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.*  
Ο συνδυασμός θερινού πολτού με ένα από τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα, είναι περισσότερο αποτελεσματικός αυτή την εποχή, λόγω της συνύπαρξης όλων των βιολογικών σταδίων των δύο κοκκοειδών.

### **2.ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ**

**Οδηγίες:** Όπου διαπιστώνονται προσβολές να γίνει καταπολέμηση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα.

**Φυτ/κά προϊόντα:** Θερινός πολτός, *Φοσμέτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.*

### **3.ΙΣΕΡΥΑ Ή ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ**

**Διαπιστώσεις:** Η έξοδος των νεαρών ερπυσών είναι σε εξέλιξη.

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει έλεγχος για την παρουσία του ωφέλιμου αρπακτικού, το οποίο εφόσον υπάρχει, θα ελέγξει τους πληθυσμούς της Ισέρυας. Όπου απαιτείται επέμβαση, αυτή να πραγματοποιηθεί από 30 Αυγούστου έως 3 Σεπτέμβρη .

**Φυτ/κά προϊόντα:** Θερινός πολτός, *Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ .*

### **4. ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΗΣ (Φυλλοκνίστης)**

**Οδηγίες-Φυτ/κά προϊόντα:** Το έντομο βρίσκεται σε δραστηριότητα. Ανάγκη προστασίας έχουν τα νεαρά δένδρα φυτώρια και εμβόλια.

Βλέπε προηγούμενο δελτίο.



## **5.ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ**

**Διαπιστώσεις:** Υπάρχουν φέτος σοβαρές προσβολές σε οπωρώνες της Αρχαίας Επιδαύρου κυρίως στην παραλιακή ζώνη. Οι εκκολάψεις ξεκίνησαν.

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει επέμβαση ως εξής:  
**Φυτ/κά** Άμεσα με *Φενοξυκάρμπ*  
**προϊόντα:** ή  
από 8 έως 12 Σεπτέμβρη με *Θερινός πολτός*.

## **6.ΚΟΚΚΟΣ**

Είναι κοκκοειδές που δεν δημιουργούσε πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια. Μοιάζει με το Λεκάνιο είναι μικρότερο σε μέγεθος πιο πεπλατυσμένο και κιτρινοκάστανο. Προσβάλλει και άλλα οπωροφόρα και καλλωπιστικά. Έχει φυσικούς εχθρούς που βρίσκονται σε δραστηριότητα αυτή την εποχή. Στα μελιτώδη εκκρίματά του αναπτύσσεται καπνιά.

**Διαπιστώσεις:** Εντοπίσαμε σποραδικές προσβολές σε οπωρώνες της Αρχαίας Επιδαύρου (Άνω Επίδαυρος) και στο Δρέπανο Αργολίδας. Οι εκκολάψεις έχουν ξεκινήσει.

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση από 8 έως 12 Σεπτέμβρη.  
Σε οπωρώνες με έντονες προσβολές θα χρειαστεί επανάληψη της επέμβασης μετά από δύο εβδομάδες.  
Μπορείτε να προσκομίζετε για έλεγχο δείγματα στην υπηρεσία μας.

**Φυτ/κά**  
**προϊόντα:** *Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινός πολτός.*

## **7. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ**

**Διαπιστώσεις:** Οι πληθυσμοί είναι υψηλοί.

**Οδηγίες:** Στα όψιμα πορτοκάλια και μανταρίνια που δεν έχουν συγκομισθεί, να συνεχισθεί η προστασία.  
Για τις υπόλοιπες ποικιλίες, σας θυμίζουμε ότι ο καρπός είναι επιδεκτικός στις προσβολές από το έντομο στο «σπάσιμο» του χρώματος του καρπού, οπότε και πρέπει να ξεκινήσουν οι ψεκασμοί.  
Θα ενημερωθείτε αναλυτικά σε επόμενο δελτίο.

## **8. ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ**

**Οδηγίες:** Δεν συνιστάται καμία χημική επέμβαση. Όταν διαπιστώνετε προσβολές να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες.  
Σε οπωρώνες που επιβάλλεται η επέμβαση για κόκκινη ψώρα και ψευδόκκοκο και υπάρχουν προσβολές από αλευρώδη, να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα με την χαμηλότερη δυνατή δόση στο παράσιτο του εριώδη αλευρώδη.

## **9. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ (Κόκκινος και κίτρινος)**

**Οδηγίες:** Χρειάζονται συχνοί και προσεκτικοί έλεγχοι. Επέμβαση απαιτείται όπου υπάρχουν προσβολές δηλαδή 3 κινητές μορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης ή κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων.

**Φυτ/κά** *Θερινά λάδια, Ετοξαζόλ, Πυρινταμπέν* (μόνο στην πορτοκαλιά),  
**προϊόντα:** {*Ασεκουινουσύλ, Μιλμπεμεκτίν* σε πορτοκαλιά και μανταρινιά},  
*Τεμπουφενπυράντ, Φενπυροξιμέιτ*  
\* Η χρήση ενός εκ των *Φενπυροξιμέιτ και Πυρινταμπέν*, δεν επιτρέπει τη χρήση του άλλου την ίδια καλλιεργητική περίοδο.  
\* *Μιλμπεμεκτίν* χρήση μια φορά στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. ►

**9. ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ (*Aculops pelecassi*) & ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ**

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει καταπολέμηση.

**Φυτ/κά προϊόντα:** Θερινός πολτός.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όπου θα χρησιμοποιηθεί θερινός πολτός, τα δένδρα θα πρέπει να είναι ποτισμένα και σε καλή θρεπτική κατάσταση. Ο ψεκασμός να είναι επιμελημένος με ιδιαίτερη σχολαστικότητα στο εσωτερικό της κόμης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:** 1. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

**2. Οι άκαιρες και με λάθος δραστικές ουσίες επεμβάσεις δημιουργούν προβλήματα στην διαχείριση των εχθρών και οικονομική επιβάρυνση στην παραγωγή.**

3. Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & Α.Α**

**Θ. ΜΗΤΣΙΝΙΚΟΣ**