



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

47/7-8-14

ΜΗΛΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Άρχισε η Τρίτη πτήση του εντόμου με υψηλούς πληθυσμούς.

Οδηγίες:

Σε μηλιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

**Φυτοпр/κά
προϊόντα:**

1.Αμέσως με τη λήψη του δελτίου με:

Αμπαμεκτίν+Χλورانτранилиπρόλ, Φενοξυκάρμπ, Χλورانτранилиπρόλ.

2.Μέχρι τις 13 Αυγούστου με:

Μεθοξυφenoζάιντ, Ντιφλουμπενζουρόν.

3.Από 14 ως 18 Αυγούστου με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) - επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, Δελταμεθρίν, (Εμαμεκτίν μπενζοείτ, Ετοφενπρόξ-μόνο στη μηλιά), Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινοςάντ, Συφλουθρίν, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από δύο εβδομάδες.

2. ΝΑΡΚΗ (ΜΗΛΙΑ)

Οδηγίες: Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Αμπαμεκτίν+Χλورانτранилиπρόλ, Θιακλοπρίντ, Μεθοξυφenoζάιντ, Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουμπενζουρόν, Σπινοςάντ, Συφλουθρίν, Φενοξυκάρμπ, Φοσμέτ, Χλورانτранилиπρόλ, Χλωρπυριφός.

3. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Οδηγίες: Οι χθεσινές καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, υγρασία) μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου.

4. ΧΑΛΑΖΙ

Οδηγίες: Οι πληγές από το χαλάζι αποτελούν πύλες εισόδου για μύκητες και βακτήρια. Απαιτείται προστασία των δένδρων μέσα στο 24ωρο με χαλκούχο σκεύασμα. ►

5. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Διαπιστώσεις:

Υπάρχουν προσβολές σε αρκετούς οπωρώνες, με συνύπαρξη όλων των βιολογικών σταδίων του τετρανύχου

Οδηγίες:

Όπου μετά από έλεγχο (5 φύλλα/δένδρο σε 20 δένδρα) διαπιστώνονται προσβολές (10 τετρανύχοι ανά φύλλο) να γίνει καταπολέμηση. Σας θυμίζουμε ότι η συχνή χρήση πυρεθρινών εντείνει τις προσβολές, επειδή επιφέρουν αύξηση στη γονιμότητα των τετρανύχων.

Φυτ/κά προϊόντα:

*Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια , Αμπαμεκτίν ,
Αμπαμεκτίν+Χλοραντраниλιπρόλ , Ασέκουινοσύλ , Μιλμπεμεκτίν,
Πυρινταμπέν, Σπιροντκλοφέν, Φενπυροξιμέιτ.*

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. **Στα μυκητοκτόνα για το φουζικλάδιο να γίνεται εναλλαγή των ομάδων των δραστικών ουσιών για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.**
2. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
3. Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ