



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629



- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

36/16-7-18

ΑΜΠΕΛΙ

1.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε νέα πτήση του εντόμου στις πρώιμες περιοχές (παραλιακή ζώνη Π. Ε Κορινθίας. Επακόλουθο των προσβολών, αυτής της γενιάς, είναι οι σήψεις.

Οδηγίες: Επέμβαση στις ανωτέρω περιοχές, καθώς και σε πρώιμα κλαδεμένους αμπελώνες των μεσοπρώιμων περιοχών, επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Φυτ/κά **Α. Άμεσα με Φενοξικάρμπ -20 μέρες.**

προϊόντα: **Β. Μέχρι τις 18 Ιουλίου :**

{ Μεθοξυφenoζάιντ -14 μέρες για οιν/μα & 7 μέρες για επιτρ.},

{ Τεμπουφenoζάιντ -21 μέρες},

{ Χλοραντρανιλιπρόλ -30 μέρες οιν/μα & 3 μέρες επιτρ.}.

{ Χλοραντρανιλιπρόλ+Θιαμεθοξάμ -30 μέρες οιν/μα,14 μέρες επιτρ.}

Γ. Από 19 ως 23 Ιουλίου με:

{Άλφα υπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν- μπενζοεϊτ, Λάμδα Συαλοθρίν, Σπινετοράμ, Σπινοςάντ -7 μέρες}, {Ιντοξακάρμπ -10 μέρες},

{Ετοφενπρόξ, Εσφενβαλερέϊτ, Μπέτα Συφλουθρίν, Σπινοςάντ, Συπερμεθρίν -14 μέρες}, { Ακριναθρίν+Αμπαμεκτίν,Ταυ φλουβαλινείτ, Χλωρπυριφός μεθύλ -21 μέρες}.

Είναι χρήσιμη μια ελαφριά αποφύλλωση. Η εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού να είναι αμφίπλευρη. Η ταχύτητα των ψεκαστικών μηχανημάτων να είναι τέτοια που να επιτρέπει την καλή διασπορά του ψεκαστικού υγρού.

Για τις υπόλοιπες περιοχές θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

2. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Οδηγίες: Συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα, όπου υπάρχουν προσβολές.

Φυτ/κά *Άλατα λιπαρών οξέων -3 μέρες, {Ασεταμιπρίντ, Σπιροτετραμάτ-14 μέρες},*
προϊόντα: *Σουλφοξαλόρ -7 μέρες, Φενοξικάρμπ -20 μέρες, Χλωρπυριφός – μεθύλ -21 μέρες.*

3. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαπιστώσεις: Τα τελευταία χρόνια δημιουργεί προβλήματα στις επιτραπέζιες ποικιλίες. Οι πληθυσμοί του εντόμου είναι αυξημένοι (προσβάλλει όλα σχεδόν τα φρούτα) και ο κίνδυνος προσβολών μεγάλος. ►

Οδηγίες: Για το επόμενο χρονικό διάστημα ως την συγκομιδή αμπελώνες που έχουν εμφανίσει προσβολές τα προηγούμενα χρόνια, να ελέγχονται συχνά για την έγκαιρη αντιμετώπιση.

Φυτ/κά προϊόντα: Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Λάμπντα συαλοθρίν, παγίδες Δελταμεθρίν (5-8 παγίδες/στρέμμα).

4.ΩΙΔΙΟ

Οδηγίες: Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τον μύκητα. Κίνδυνος προσβολών για τις ρόγες υπάρχει μέχρι το στάδιο του γυαλίσματος. Βλαστοί, ποδίσκοι και άξονες των σταφυλιών, είναι ευπαθείς καθ όλη την καλλιεργητική περίοδο. Απαιτείται συστηματικός έλεγχος των αμπελώνων για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών.

Φυτ/κά προϊόντα: {Σπόρια του μύκητα *Ampelomyces quisqualis* -0 μέρες }, { Διττανθρακικό Κάλιο -1 μέρα }, { Λαμιναρίν -0 μέρες }, {Θείο -7 μέρες}, { Φλουοπιράμ+Τεμπουκοναζόλ -14 μέρες μόνο σε οινοποιήσιμα } {Θείο + Οξυχλωριούχος χαλκός - 28 μέρες}, { Μπουπιριμέιτ, Μπουπιριμέιτ+ Τεμπουκοναζόλ, -14 μέρες }, { Σπιροξαμίν -14 μέρες επιτραπέζια, 35 μέρες οινοποιήσιμα }, { Αζοξυστρομπίν, Μεπτυλντινοκάπ, Αζοξυστρομπίν+ Τεμπουκοναζόλ, Μυκλομπουτανίλ, Ντιφenoκοναζόλ, Συφλουφεναμίντ, Τεμπουκοναζόλ Συφλουφεναμίντ+Ντιφenoκοναζόλ -21 μέρες }, { Μετραφενόν, Προκουιναζίντ, Πυριοφενόν, Συπροκοναζόλ, Φενμπουκοναζόλ, Τριφλοξιστρομπίν -28 μέρες }, { Κυνοξιφέν -30 μέρες οιν/μα, 21 μέρες επιτραπέζια }, { Κρεσοξυμ μεθύλ -42 μέρες }, { Μποσκαλίντ+Κρεσόξιμ μεθύλ, Ντιμεθομόρφ+Πυρακλoστρομπίν, Πενκοναζόλ, Τριαντιμενόλ, Προπινέμπ+Τριαντιμενόλ, Φλουξαπυροξάντ -35 μέρες }.

5. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις-Οδηγίες: Υπάρχουν σοβαρές προσβολές στους αμπελώνες της ΠΕ Αρκαδίας και σποραδικές προσβολές στην ευρύτερη περιοχή της Νεμέας. Στους αμπελώνες των περιοχών αυτών απαιτείται επέμβαση χρησιμοποιώντας σκεύασμα με οπωσδήποτε θεραπευτική δράση.

Φυτ/κά προϊόντα: Βλέπε δελτίο 12/10-4-18.

6.ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Οδηγίες: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω των πληγών που δημιουργήσαν οι βροχοπτώσεις. Αμπελώνες που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία να ελέγχονται συστηματικά.

Φυτ/κά προϊόντα: Βλέπε δελτίο 31/27-6-18

7.ΞΗΡΑΝΣΗ ΡΑΧΗΣ

Οδηγίες: Καλλιεργητικά μέτρα που μπορεί να επιδράσουν θετικά στην προληπτική αντιμετώπισή της:

- Βελτίωση της υφής και της γονιμότητας του εδάφους με προσθήκη οργανικής ουσίας για την καλύτερη τροφοδοσία των πρέμνων με νερό.
- Κατάλληλο κλάδεμα και βλαστολόγημα (ζωηρά πρέμνα με γρήγορα αναπτυσσόμενη βλάστηση παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία.
- Αποφυγή πλούσιας λίπανσης (ιδιαίτερα της καλιούχου).

Σε αμπελώνες που υπάρχει το πρόβλημα να γίνει επέμβαση με κατάλληλο σκεύασμα που περιέχει μαγνήσιο, η οποία να επαναληφθεί μετά από 10-15 μέρες. Να γίνεται καλή διαβροχή των σταφυλιών.



8.ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ

Η ασθένεια ευνοείται από υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης, υπερβολικό φορτίο, την ύπαρξη πληγών στις ράγες και την αύξηση του πληθυσμού της Δροσόφιλας (μύγα του ξιδιού). Η Δροσόφιλα είναι ο κύριος φορέας των παθογόνων της ασθένειας.

Οδηγίες:

- **Βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της ασθένειας είναι η αποφυγή δημιουργίας πληγών στις ράγες. Επομένως η καταπολέμηση του ωιδίου και της ευδεμίδας, πρέπει να γίνεται με μεγάλη επιμέλεια.**
- **Κλάδεμα, στήριξη σε πολλά σύρματα, με σκοπό την μείωση της υγρασίας και την καλύτερη δυνατή έκθεση των σταφυλιών στον ήλιο.**
- **Προσοχή στις αρδεύσεις και στις λιπάνσεις, για τον έλεγχο της ζωηρότητας του πρέμνου.**
- **Τα χαλκούχα σκευάσματα σκληραίνουν την επιδερμίδα των ραγών.**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. **Οι ημέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία επέμβαση έως τη συγκομιδή.**
 2. Οι επεμβάσεις κοντά στη συγκομιδή εμπεριέχουν κινδύνους εύρεσης υπολειμμάτων άνω των επιτρεπόμενων ορίων στα σταφύλια. **Να τηρούνται αυστηρά τα χρονικά όρια που αναφέρονται στην ετικέτα, μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.** Λόγω της πρωιμότητας απαιτείται φέτος ιδιαίτερη προσοχή.
 3. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο www.minagric.gr

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ