


- 
- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
 - Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ**

Ταχ. Διεύθυνση : Παραλιακή οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου
Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο
Τηλ.: 2752026241
Πληροφορίες: Γ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αρ. Δελτίου 17 / 31-5-22

ΑΜΠΕΛΙ

1.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις: Η 2^η πτήση του εντόμου ξεκίνησε στις πρώιμες & μεσοπρώιμες περιοχές.

Οδηγίες: Επέμβαση στις ανωτέρω περιοχές, επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Φυτ/κά προϊόντα: **A. Μέχρι τις 2 Ιουνίου με σκευάσματα με ωοκτόνο δράση.**
B. Από 3 έως 6 Ιουνίου με παρεμποδιστές και βιολογικά σκευάσματα.
Γ. Από 7 ως 10 Ιουνίου με τα υπόλοιπα εγκεκριμένα σκευάσματα.

Για τις υπόλοιπες περιοχές οι ημερομηνίες να μεταφερθούν κατά ένα εβδομήμερο.

Το ψεκαστικό υγρό να κατευθύνεται στα σταφύλια και να διασπείρεται στο σύνολο της επιφάνειάς τους. Μια ελαφριά αποφύλλωση είναι χρήσιμη. Η εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού να είναι αμφίπλευρη. Η ταχύτητα των ψεκαστικών μηχανημάτων να είναι τέτοια που να επιτρέπει την καλή διασπορά του ψεκαστικού υγρού.

2. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Διαπιστώσεις: Οι εκκολάψεις πλησιάζουν στο τέλος και ο περισσότερος πληθυσμός είναι νύμφες πρώτου σταδίου.

Οδηγίες: Ελέγξτε τα αμπέλια με μεγάλη προσοχή (κυρίως κάτω από τα ρυτιδώματα και πρέμνα που κυκλοφορούν μυρμήγκια). Όπου διαπιστώνετε την ύπαρξη του εντόμου, να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Το ψεκαστικό υγρό να βρίσκει τις αποικίες του εντόμου και καλό είναι να περνάει και μέσα στα ρυτιδώματα. Ο επαρκής αερισμός και ο φωτισμός είναι ανασταλτικοί παράγοντες για το έντομο.

3.ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ

Οδηγίες: Όπου μετά από έλεγχο διαπιστωθούν προσβολές να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα.

4. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Οδηγίες: Εντείνετε τους ελέγχους για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών και άμεση επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα.

5. ΩΙΔΙΟ

Οδηγίες: Τα αμπέλια βρίσκονται σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές και πρέπει να είναι προστατευμένα. Η επέμβαση να είναι σχολαστική και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αμπελώνες με ιστορικό προσβολών και ευαίσθητες ποικιλίες.

Για την αποφυγή ή καθυστέρηση δημιουργίας ανθεκτικότητας:

- 1. Να εναλλάσσονται οι δραστικές ουσίες ανάλογα με τον τρόπο δράσης τους μέσα στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.**
- 2. Να τηρείται ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.**
- 3. Να χρησιμοποιείται η μικρότερη αποτελεσματική δόση εφαρμογής.**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Μην υπερβαίνετε τις αναγραφόμενες δόσεις των σκευασμάτων.
2. Μην αναμιγνύετε περισσότερα από δύο σκευάσματα στο ίδιο ψεκαστικό διάλυμα.
3. Οι άκαιρες και χωρίς λόγο επεμβάσεις, επιβαρύνουν οικονομικά και ζημιώνουν το περιβάλλον.
4. **Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.**
5. Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)



Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & α.α.

ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ