



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: Πανεπιστημίου 334  
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ  
Τηλ.: 2610.224.629  
Fax: 2610.623.238  
Email: pkpfpatr@otenet.gr  
Πληροφορίες: Ν. Πέπτας

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

ΑΧΑΪΑΣ  
ΗΛΕΪΑΣ  
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ

**ΠΑΤΑΤΑ: Νο 1 / 18-02-2013**

**ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:**

**Διαπιστώσεις:** Σε σχέση με το σύνηθες, υπήρξε καθυστέρηση και κλιμάκωση στην σπορά σε όλες τις περιοχές εξαιτίας του άστατου καιρού και κυρίως των έντονων βροχοπτώσεων της προηγούμενης περιόδου.

Η κατάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη των πατατοκαλλιεργειών έχει ως εξής:

Στη Μεσσηνία, το φύτευμα ξεκίνησε από το πρώτο 10-ήμερο του Ιανουαρίου και μέχρι τις 20 Ιανουαρίου είχαν φυτρώσει οι περισσότερες φυτείες. Σήμερα, οι περισσότερες καλλιέργειες βρίσκονται σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές από τον περονόσπορο (περίπου 20εκ.).

Στην πρώιμη παραλιακή ζώνη της Αχαΐας το φύτευμα ξεκίνησε από τις αρχές του Φλεβάρη, ενώ στην υπόλοιπη Αχαΐα καθώς και στην Ηλεία οι πατάτες βρίσκονται στην αρχή του φυτρώματος.

Οι βροχοπτώσεις στις 14/02 και στις 16/02 ύψους 9,6 και 13,2 χιλ. συνετέλεσαν ώστε τα φύλλα να μείνουν βρεγμένα για πολλές συνεχείς ώρες, γεγονός που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των μολύνσεων. Ωστόσο, η θερμοκρασία τις αντίστοιχες περιόδους ήταν αρκετά χαμηλή, γεγονός που δεν διευκόλυνε την έναρξη μολύνσεων (βλ. πίνακα).

Ημέρα	Διάρκεια δύγρανσης (ώρες)	Μέση θερ/σία (°C)	Βροχή (mm)
14/02/2013	24	9,24	9,6
15/02/2013	12	8,6	1
16/02/2013	15	7,75	13,2
17/02/2013	13	7,82	1,8

**Συστάσεις:** Σε όλες τις περιοχές προβλέπεται να παραταθεί ο άστατος καιρός με ταυτόχρονη αύξηση της θερμοκρασίας και πιθανόν να ευνοηθούν μολύνσεις. Στην Μεσσηνία συστήνεται ή άμεση προστασία για τον Περονόσπορο στις πατατοκαλλιέργειες που βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο προσβολής από την ασθένεια. Στις υπόλοιπες καλλιέργειες δεν συνιστάται προς το παρόν προστασία.

**Φάρμακα:** Από την λίστα των μυκητοκτόνων που ακολουθεί, επιλέξτε κυρίως τα προστατευτικά, με τις μικρότερες συνιστώμενες δόσεις και το μεγαλύτερο μεσοδιάστημα μεταξύ των ψεκασμών

Σημειώνεται, ότι η καταπολέμηση του Περονόσπορου της πατάτας είναι προληπτική. Η προστασία πρέπει να είναι συνεχής, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τη διάρκεια δράσης των μυκητοκτόνων, την ύπαρξη ή όχι φυτών εθελοντών και σωρών ασυγκόμιστης και καταστραμμένης πατάτας. Ακόμα και τα φυτοπροστατευτικά που αναφέρονται ότι έχουν θεραπευτική δράση πρέπει να χρησιμοποιούνται προληπτικά. Οι Γεωργικές Προειδοποιήσεις υποδεικνύουν τις ημερομηνίες ψεκασμού στις κρίσιμες περιόδους προσβολής, πριν την εμφάνιση νέων κηλίδων, για να προστατεύεται το υγιές φύλλωμα.

Όλα τα δελτία είναι αναρτημένα στον κόμβο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
Msc/Msc Τεχν. Τροφίμων**

**Παραλαβή των δελτίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο** γίνεται με απλό αίτημα στο [pkpfpatr@otenet.gr](mailto:pkpfpatr@otenet.gr)